

Описан из Бразилии.

ЗЗ: Рион.-Квир. (окр. г. Махарадзе), Адж. (окр. Батуми); **Т** (близ оз. Марцо).
Заносное.

Южн. Америка.

3 (532). **C. bonariensis** (L.) Cronquist, 1943, Bull. Torrey Bot. Club, 70, 6: 632. — *Erigeron bonariensis* L. 1753, Sp. Pl.: 863. — *E. crispus* Pourr. 1788, Mém. Acad. Sci. Toulouse, 3: 318; Боч. 1959, Фл. СССР, 25: 286. — *Conyza crispa* (Pourr.) Cronquist ex Kolak. 1982, Фл. Абх. изд. 2, 2: 48, comb. illeg.

Описан из Аргентины.

ЗЗ; ВЗ: Ширв., Н. Кур.; **Т.** Заносное.

Южн. Америка.

4 (533). **C. canadensis** (L.) Cronquist, 1943, Bull. Torrey Bot. Club, 70, 6: 632. — *Erigeron canadensis* L. 1753, Sp. Pl.: 863; Боч. 1959, Фл. СССР, 25: 239.

Описан по материалам из Северной Америки и Южной Европы.

Во всех районах Кавказа. Заносное.

Европа; Азия; Африка; Америка; Австралия (происходит из Сев. Америки).

18 (128). **Conyzanthus** Tamamsch.

1 (534). **C. graminifolius** (Spreng.) Tamamsch. 1959, Фл. СССР, 25: 186. — *Conyza graminifolia* Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 515. — *Aster squamatus* Hieron. var. *graminifolius* (Spreng.) Cabrera, 1941, Rev. Mus. La Plata (Bot.), 5, 4: 69. — *A. squamatus* auct. non (Spreng.) Hieron.: Yeo, 1976, Fl. Europ. 4: 115, p. p.

Описан из Уругвая.

ЗЗ: Абх., Адж.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т.** Заносное.

Южн. Америка.

2 (535). **C. squamatus** (Spreng.) Tamamsch. 1959, Фл. СССР, 25: 186. — *Conyza squamata* Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 515.

Описан из Уругвая.

ЗЗ: Адж. (окр. Батуми); **ВЗ:** Ширв. (окр. Баку). Заносное.

Южн. Америка.

19 (129). **Dichrocephala** L'Hér.

1 (536). **D. integrifolia** (L. f.) Kuntze, 1891, Rev. Gen. Pl. 1: 133. — *Hippia integrifolia* L. f. 1781, Suppl. Pl.: 389. — *Cotula bicolor* Roth, 1800, Cat. Bot. 2: 116. — *Dichrocephala bicolor* (Roth) Schltr. 1852, Linnaea, 25: 209; Тамамш. 1959, Фл. СССР, 25: 51.

Описан из Индии.

ЗК; ЦК: В. Тер. (окр. Владикавказа); **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек.; **Т.**

Юго-Зап., Южн. Азия; Африка.