

2 (110). *Nymphoides* Ség.

1 (466). *N. peltata* (S. G. Gmel.) Kuntze, 1891, Rev. Gen. 2: 429. — *Limnanthemum peltatum* S. G. Gmel. 1770, Novi Comment. Acad. Sci. Petropol. 14, 1: 527. — *Menyanthes nymphoides* L. 1753, Sp. Pl.: 145.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (юг), Юго-Зап. (сев.-зап. Иран), Ср. (сев.), Центр., Вост. Азия.

ORDO 63. ASTERALES

Fam. 131. **ASTERACEAE** Bercht. et J. Presl

Subfam. 1. **ASTEROIDEAE** (Cass.) Lindl.

Ttrib. 1. **Eupatorieae** Cass.*

Subtrib. 1. **Ageratinae** O. Hoffm.

1 (111). *Ageratum* L.

1 (467). *A. houstonianum* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, № 2. — *A. obtusifolium* Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 54. — *A. mexicanum* Sims, 1824, Curtis's Bot. Mag. 52: tab. 2524; Кут. 1952, Фл. Груз. 8: 214. — *A. conyzoides* L. var. *houstonianum* (Mill.) Sahu, 1982, Feddes Repert. 93, 1-2: 64. — *A. conyzoides* L. subsp. *houstonianum* (Mill.) M. Sharma, 1984, Geobios, New. Rep. 3, 2: 152. — *A. conyzoides* auct. non L.: Кут. 1952, цит. соч.: 215.

Описан из Мексики.

ЗЗ: Адж. (Салибаури, Батумский бот. сад.). Культивируется и дичает. Южн., Юго-Вост. Азия; Сев., Центр. Америка.

2 (112). *Stevia* Cav.

1 (468). *S. ovata* Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol.: 855. — *S. paniculata* Lag. 1816, Gen. Sp. Pl.: 27; Колак. 1949, Фл. Абх. 4: 191; Сахок. 1952, Фл. Груз. 8: 215.

Описан из Мексики.

Указан как сорное для **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1949: 191).

Сев., Центр. Америка.

3 (113). *Eupatorium* L.

1 (469). *E. cannabinum* L. 1753, Sp. Pl.: 838. — *E. caucasicum* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 2: 371. — *E. hyrcanicum* Steven, 1856, l. c.: 371.

* Ю. Л. Меницкий.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК;** **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрин., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 100), всех районов Предкавказья (Галушко, 1980: 164); **ЗК:** Уруп-Теб., В.-Куб.; **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 40; Танфильев, Кононов, 1987: 100; Воробьева, Кононов, 1991: 112); **ЗЗ:** Инг.-Рион, Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Дар., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1934:90; Кутателадзе, 1952: 216; Ахундов, 1961: 188; Гагнидзе, Кемуляриа-Натадзе, 1985: 66; Аветисян, 1995: 452).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Subtrib. 2. *Adenostylinae* O. Hoffm.

4 (114). *Liatris* Schreb.

1 (470). **L. spicata** (L.) Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1636. — *Serratula spicata* L. 1753, Sp. Pl.: 819. — *Suprago spicata* (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 402, tab. 167. — *Liatris macrostachya* Michx. 1803, Fl. Bor.-Amer. 2: 91. — *L. sessiliflora* Bertol. 1846, Misc. Bot. 5: 10, tab. 2.

Описан из Северной Америки.

ЗЗ: Адж. (одичавшее в окр. Батумского бот. сада на берегу моря).
Сев. Америка.

Trib. 2. *Astereae* Cass.*

5 (115). *Grindelia* Willd.

1 (471). **G. squarrosa** (Pursh) Dunal, 1819, Mém. Mus. Hist. Nat. (Paris), 5: 50. — *Donia squarrosa* Pursh, 1813, Fl. Amer. Sept. 2: 559.

Описан из Северной Америки.

СЗЗ: Анап.-Гел. (заносное близ Анапы).

Сев. Америка; заносное в Южн. и Вост. Европе, Вост. Азии.

6 (116). *Solidago* L.

Sect. 1. *Solidago*

1 (472). **S. virgaurea** L. 1753, Sp. Pl.: 880.

Описан из Европы.

ЗК; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрин., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

* Н. Н. Цвелёв.