

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. (сев.), Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка.

2 (572). **O. alpigena** (C. Koch) Holub, 1976, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 11: 81. — *Gnaphalium alpigenum* C. Koch, 1851, Linnaea, 24: 354. — *G. caucasicum* Sommier et Levier, 1895, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 2: 85. — *Synchaeta caucasica* (Sommier et Levier) Kirp. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20: 313. — *Omalotheca caucasica* (Sommier et Levier) Czer. 1981, Сосуд. раст. СССР: 88.

Описан с Кавказа. Т у р у с: «Im kaukasischen Hochgebirge auf Kalk, Thonschiefer und Porphyr, 3000–6000' hoch, leg. C. Koch» (В?).

**ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан. Юго-Зап. Азия.

3 (573). **O. stewartii** (C. B. Clarke) Holub, 1977, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 12: 429. — *Gnaphalium stewartii* C. B. Clarke, 1881, in Hook. f. Fl. Brit. India, 3: 289. — *G. supinum* auct. non L.: Кирп. 1959, Фл. СССР, 25: 402, p. p.

Описан с Гималаев («Western Himalaya, leg. Stewart»).

**ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг. Юго-Зап., Южн. (Гималаи) Азия.

4 (574). **O. supina** (L.) DC. 1837, Prodr. 6: 245. — *Gnaphalium supinum* L. 1768, Syst. Nat. ed. 12, 3: 234; Кирп. 1959, Фл. СССР, 25: 402, p. p.

Описан из Европы.

**ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Европа (Арктика и горные районы); Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Америка.

## 32 (142). *Antennaria* Gaertn.\*

1 (575). **A. dioica** (L.) Gaertn. aggr.

1а. **A. caucasica** Boriss. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20: 289; Борис. 1959, Фл. СССР, 25: 330, descr. ross. — ? *A. dioica* (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 410, s. l.; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 101; Шхиян, 1952, Фл. Груз. 8: 260; Grierson, 1975, Fl. Turk. 5: 80.

Описан с Центрального Кавказа. Т у р у с: «Балкария, Сукан, каменистая россыпь Сукан-баши-уллырха, 2550 м, 30 VII 1925, Е. и Н. Буш» (LE). Р а г а - т у р у с (указан в гербарии как тип): «Терская обл., сосновый лес по р. Адылу, 9 VII 1911, Е. et N. Busch» (LE!).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для всех горных районов Северного Кавказа от Верхне-Лабинского до Дагестана (Галушко, 1980: 170); всех горных районов Грузии (Шхиян, 1952: 260); **ВЗ:** Ширв. (Ахундов, 1961: 211); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев. (Аветисян, 1995: 510).

\* Ю. Л. Меницкий.

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

Ранг *A. caucasica* не совсем ясен. Вероятно, является подвидом *A. dioica* с опушенными с обеих сторон, лишенными остроконечий листьями и белыми, более крупными корзинками. Недостаточно ясно и его распространение. На протяжении своего обширного ареала (от Англии, Скандинавии и Испании до Камчатки и Сахалина) *A. dioica* не однороден: на северо-западе преобладает форма с голыми сверху, остроконечными листьями и более мелкими корзинками с красноватыми листочками обертки; к югу и востоку преобладает форма с опушенными с обеих сторон листьями. Вторая форма доминирует в Центральной Европе и, по свидетельству А. J. C. Grierson (1975, l. c.), в Турции и Сибири. Описанный А. Г. Борисовой (1960, l. c.) вид недостаточно ясно охарактеризован по отношению к южным (малоазиатским) и восточным популяциям *A. dioica*. Борисова считает, что он произрастает в Турции, а Grierson это отрицает. Диагноз *A. caucasica* очень хорошо отличает этот таксон только от скандинавской формы *A. dioica*, так что его описание как нового вида не вносит существенного вклада в познание изменчивости полиморфного и, по-видимому, политипического *A. dioica*.

### 33 (143). *Lasiopogon* Cass.\*

1 (576). **L. muscoides** (Desf.) DC. 1837, Prodr. 6: 246. — *Gnaphalium muscoides* Desf. 1800. Fl. Atl. 2: 267.

Описан из Средиземноморья.

**ВЗ:** Ширв. («О-в Жилой, IV 1947, геол.-разв. партия»).

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Аравия, Иран, Афганистан); Южн. Африка.

### 34 (144). *Cladochaeta* DC.\*

1 (577). **C. candidissima** (Bieb.) DC. 1837, Prodr. 6: 245. — *Gnaphalium candidissimum* Bieb. 1800, Besch. Länd. Casp. Meere, App. № 69 (non vidi); id. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 299. — *Helichrysum candidissimum* D. Don ex G. Don, 1830, in Loud. Hort. Brit.: 341 (non vidi); Benth. et Hook. 1873-1876, Gen. Pl. 2: 311. — *Cladochaeta caspica* Sosn. ex Grossh. 1934, Фл. Кавк. 4: 105; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 446. — ? *C. velutina* Anderb. 1991, Op. Bot. 104: 150 (ex Index Kew. 1997).

Описан с Кавказа («in glareosis, ad torrentes montium caucasicorum»). *Le s e t o t y p u s* (Menitzky, hoc loco; Бялт, in sched.): «Ex montibus Schirvanicis, 1796 [Bieberstein]» (LE!).

**ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Караб.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Н.-Кур.

Указан для **ЮЗ** и **Т** (Борисова, 1959: 431). Указание сомнительно, так как этот род не приводится во «Флоре Азербайджана» (Ахундов, 1961: 222) и «Флоре Армении».

Эндемик.

---

\* Ю. Л. Меницкий.