

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

Ранг *A. caucasica* не совсем ясен. Вероятно, является подвидом *A. dioica* с опущенными с обеих сторон, лишенными остроконечий листьями и бельмы, более крупными корзинками. Недостаточно ясно и его распространение. На протяжении своего обширного ареала (от Англии, Скандинавии и Испании до Камчатки и Сахалина) *A. dioica* не однороден: на северо-западе преобладает форма с голыми сверху, остроконечными листьями и более мелкими корзинками с красноватыми листочками обертки; к югу и востоку преобладает форма с опущенными с обеих сторон листьями. Вторая форма доминирует в Центральной Европе и, по свидетельству А. Дж. С. Гриerson (1975, 1. с.), в Турции и Сибири. Описанный А. Г. Борисовой (1960, 1. с.) вид недостаточно ясно охарактеризован по отношению к южным (малоазиатским) и восточным популяциям *A. dioica*. Борисова считает, что он произрастает в Турции, а Grierson это отрицает. Диагноз *A. caucasica* очень хорошо отличает этот таксон только от скандинавской формы *A. dioica*, так что его описание как нового вида не вносит существенного вклада в познание изменчивости полиморфного и, по-видимому, политипического *A. dioica*.

33 (143). **Lasiopogon** Cass.*

1 (576). **L. muscoides** (Desf.) DC. 1837, Prodr. 6: 246. — *Gnaphalium muscoides* Desf. 1800. Fl. Atl. 2: 267.

Описан из Средиземноморья.

В3: Ширв. («О-в Жилой, IV 1947, геол.-разв. партия»).

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Аравия, Иран, Афганистан); Южн. Африка.

34 (144). **Cladochaeta** DC.*

1 (577). **C. candidissima** (Bieb.) DC. 1837, Prodr. 6: 245. — *Gnaphalium candidissimum* Bieb. 1800, Beschr. Länd. Casp. Meere, App. № 69 (non vidi); id. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 299. — *Helichrysum candidissimum* D. Don ex G. Don, 1830, in Loud. Hort.: 341 (non vidi); Benth. et Hook. 1873-1876, Gen. Pl. 2: 311. — *Cladochaeta caspica* Sosn. ex Grossh. 1934, Фл. Кавк. 4: 105; Grossg. 1949, Опред. раст. Кавк.: 446. — ? *C. velutina* Anderb. 1991, Op. Bot. 104: 150 (ex Index Kew. 1997).

Описан с Кавказа («in glareosis, ad torrentes montium caucasicorum»). Le c - to t u p u s (Menitzky, hoc loco; Бялт, in sched.): «Ex montibus Schirvanicis, 1796 [Bieberstein]» (LE!).

ВП: В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Караб.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **В3:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Н.-Кур.

Указан для **ЮЗ** и **Т** (Борисова, 1959: 431). Указание сомнительно, так как этот род не приводится во «Флоре Азербайджана» (Ахундов, 1961: 222) и «Флоре Армении».

Эндемик.

* Ю. Л. Меницкий.