

Subtrib. 4. **Bupthalinae** O. Hoffm.\*

39 (149). **Pallenis** Cass.

1 (599). **P. spinosa** (L.) Cass. 1825, Dict. Sci. Nat. 37: 275. — *Bupthalmum spinosum* L. 1753, Sp. Pl.: 903.

Описан из Европы.

**БК:** Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **Т:**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

40 (150). **Telekia** Baumg.

1 (600). **T. speciosa** (Schreb.) Baumg. 1816, Enum. Stirp. Transsilv. 3: 150. — *Bupthalmum speciosum* Schreb. 1766, Icon. Descr. Pl. 1: 11, tab. 6. — *Telekia cordifolia* DC. 1836, Prodr. 5: 485. — *T. ovata* C. Koch, 1850, Linnaea, 23: 712.

Описан из Турции («Каппадокии»).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК:** Асо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ:** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ю. Караб.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 102); всех лесных районов Северного Кавказа от Ходыженского до Дагестана (Галушко, 1980: 176); **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Занг. (Гроссгейм, 1934: 111; Ахундов, 1961: 236; Аветисян, 1995: 545).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

Trib. 4. **Ambrosieae** Cass.\*

41 (151). **Cyclachaena** Fresen.

1 (601). **C. xanthifolia** (Nutt.) Fresen. 1836, Index Sem. Horti Frankf.: 4. — *Iva xanthifolia* Nutt. 1818, Gen. N. Amer. Pl. 2: 185; Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 449.

Описан из Америки.

**ЗП:** З. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. Заносное, сорное.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1980: 176).

Сев. Америка; заносное в Европе и Вост. Азии.

42 (152). **Ambrosia** L.

1 (602). **A. artemisiifolia** L. 1753, Sp. Pl.: 988.

Описан из Северной Америки.

**ЗП;** **ЗК:** Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК;** **ЗЗ:** Адж.

\* Ю. Л. Меницкий.