

3 (608). **X. occidentale** Bertol. 1822, Lucubr. 2: 36, sensu Smoljan. 1959, Фл. СССР, 25: 525. — *X. orientale* auct. non L.: Гросср. 1934, Фл. Кавк. 4: 112.

Описан из Италии.

ЗЗ: Туап.-Адл., Инг.-Рион., Адж.; **ВЗ**: Н. Кур. Заносное, сорное.

Указан для **ЗЗ**: Абх. (Думбадзе, 1952: 296; Колаковский, 1982: 121); **ЮЗ**: Нах. (Ахундов, 1961: 240).

Европа (заносное); Сев., Центр. Америка.

4 (609). **X. californicum** Greene, 1899, Pittonia, 4: 62, sensu Smoljan. 1959, Фл. СССР, 25: 526. — *X. italicum* Moretti, 1822, Giorn. Fis. (Brugnat.), ser. 2, 5: 326; В. Е. Авет. 1995, Фл. Арм. 9: 496. — ? *X. cavanillesii* Schouw, 1849, Index Sem. Horto Haun.: 14. — *X. strumarium* L. subsp. *cavanillesii* (Schouw) D. Löve et Dans. 1959, Canad. Journ. Bot. 37: 205; Kupicha, 1975, Fl. Turk. 5: 48. — *X. strumarium* L. subsp. *italicum* (Moretti) D. Löve, 1976, Journ. Linn. Soc. London (Bot.), 71: 271.

Описан из Северной Америки.

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ**: Ерев. Заносное, сорное.

Указан для **ЗП**; **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1980: 177; Танфильев, Кононов, 1987: 103); **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 177); **ЗЗ**: Адж. (Дмитриева, 1990: 27); всех районов Армении (Аветисян, 1995: 496).

Космополит.

Trib. 5. **Heliantheae** Cass.*

Subtrib. 1. **Verbesininae** Cass.

44 (154). **Sigesbeckia** L.

1 (610). **S. orientalis** L. 1753, Sp. Pl.: 900. — *S. iberica* Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 2220. — *S. caspica* Fisch. et C. A. Mey. ex Hohen. 1838, Bull. Soc. Nat. Moscou. 11, 3: 285.

Описан по материалам из Китая и Ирана.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **Т**. Заносное, сорное.

Указан для **ЗП**: З. Ставр.; **ЦК**: В. Кум.; **ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 177; Танфильев, Кононов, 1987: 103); **ЮЗ**: Ерев., Занг. (Аветисян, 1995: 490).

Космополит.

45 (155). **Eclipta** L.

1 (611). **E. prostrata** (L.) L. 1771, Mantissa Alt.: 286. — *Verbesina prostrata* L. 1753, Sp. Pl.: 902. — ? *V. alba* L. 1753, l. c.: 902. — *Eclipta marginata* Steud. 1840,

* Ю. Л. Меницкий.

Nomencl. Bot. 1: 542; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 249; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 113. — ? *E. alba* (L.) Hassk. 1848, Pl. Jav. Rar.: 528; Boiss. 1875, l. c.: 249; Гроссг. 1934, цит. соч.: 113; Вас. 1959, Фл. СССР, 25: 538.

Описан из Индии.

ВЗ: Н. Кур.; **Т:** Заносное, сорное.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран); Южн., Юго-Вост. Азия; Америка.

Subtrib. 2. **Coreopsidinae** O. Hoffm.

46 (156). **Bidens** L.

1 (612). **B. tripartita** L. 1753, Sp. Pl.: 832.

Описан из Европы.

ЗП; ВП: Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Асо-Арг., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан.; **Т:**

Указан для всех районов Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 103); всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 178); **ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ:** Араг. (Гроссгейм, 1934: 114; Аветисян, 1995: 492); **ЮЗ:** Ерев., Дар., Занг. (Ахундов, 1961: 246; Аветисян, 1995: 492).

Умеренная Евразия; Сев. Африка; Сев. Америка.

2 (613). **B. frondosa** L. 1753, Sp. Pl.: 832.

Описан из Северной Америки.

ЗК: Бело-Лаб. (между ст. Белореченской и Майкопом, 14 IX 1994, Н. Цвелёв; близ г. Майкопа, 14 IX 1994, он же); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Бетта, 17 IX 1994, он же); **ЗЗ:** Абх. (Гагида, эфирно-масличное хозяйство, 22 IX 1988, С. Читанова). Заносное, сорное.

Сев. Америка; заносное в Европе. и Вост. Азии (г. Владивосток).

3 (614). **B. cernua** L. 1753, Sp. Pl.: 832.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ЦК:** В. Кум., Малк. (Галушко, 1980: 177; Танфильев, Кононов, 1987: 103); **ЗЗ:** Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Лори; **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1934: 114; Гагидзе, Кемуляриа-Натадзе, 1985: 63; Дмитриева, 1990: 28; Аветисян, 1995: 492).

Умеренная Евразия; Сев. Америка.

4 (615). **B. bipinnata** L. 1753, Sp. Pl.: 832.

Описан из Северной Америки.

ЗЗ: Абх. (заносное).

Сев. Америка; заносное в Европе, Южн. Азии и Сев. Африке.