

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК;** **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 100), всех районов Предкавказья (Галушко, 1980: 164); **ЗК:** Уруп-Теб., В.-Куб.; **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 40; Танфильев, Кононов, 1987: 100; Воробьева, Кононов, 1991: 112); **ЗЗ:** Инг.-Рион, Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Дар., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1934:90; Кутателадзе, 1952: 216; Ахундов, 1961: 188; Гагнидзе, Кемуляриа-Натадзе, 1985: 66; Аветисян, 1995: 452).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Subtrib. 2. *Adenostylinae* O. Hoffm.

4 (114). *Liatris* Schreb.

1 (470). **L. spicata** (L.) Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1636. — *Serratula spicata* L. 1753, Sp. Pl.: 819. — *Suprago spicata* (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 402, tab. 167. — *Liatris macrostachya* Michx. 1803, Fl. Bor.-Amer. 2: 91. — *L. sessiliflora* Bertol. 1846, Misc. Bot. 5: 10, tab. 2.

Описан из Северной Америки.

ЗЗ: Адж. (одичавшее в окр. Батумского бот. сада на берегу моря).
Сев. Америка.

Trib. 2. *Astereae* Cass.*

5 (115). *Grindelia* Willd.

1 (471). **G. squarrosa** (Pursh) Dunal, 1819, Mém. Mus. Hist. Nat. (Paris), 5: 50. — *Donia squarrosa* Pursh, 1813, Fl. Amer. Sept. 2: 559.

Описан из Северной Америки.

СЗЗ: Анап.-Гел. (заносное близ Анапы).

Сев. Америка; заносное в Южн. и Вост. Европе, Вост. Азии.

6 (116). *Solidago* L.

Sect. 1. *Solidago*

1 (472). **S. virgaurea** L. 1753, Sp. Pl.: 880.

Описан из Европы.

ЗК; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

* Н. Н. Цвелёв.