

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

Вид *A. cuneatiloba*, рассматриваемый мною как синоним *A. biebersteinii*, описан Р. Е. Boissier и Ф. А. Buhse (1860) по сборам Buhse из Табриза. В ЛЕ хранится гербарный экземпляр *A. cuneatiloba* с 2 этикетками: «Nachitshevan, 1847, Buhse» и «Tabris, 12 VII 1847, Buhse», который, очевидно, является аутентиком. Других образцов я не видела. Изучение данного экземпляра и сравнение его с обширным гербарным материалом по *A. biebersteinii* с Кавказа, а также наблюдение за этим видом в природе показали, что более крупные экземпляры с б. или м. широкими долями листьев и светло-желтыми язычковыми цветками типа *A. cuneatiloba* встречаются довольно часто. Эта форма не отличается от последнего специфическим строением семянки и листочков обертки и вряд ли заслуживает видового статуса, хотя А. Huber-Morath (1986) признает самостоятельность *A. cuneatiloba*. Он приводит его только по типовому экземпляру («Nemadabad prope Tabris, Buhse» — G).

12 (647). **A. leptophylla** Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 335.

Описан из Крыма.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.

Юго-Вост. (Румыния, Болгария), Вост. (Украина, юг России) Европа.

Sect. 4. **Filipendulinae** DC.

13 (648). **A. filipendulina** Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 27.

Описан из стран «Леванта». Т у р у s: «Levant, Tournefort» (P).

ВП: Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ЦК:** В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 44).

Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

14 (649). **A. latiloba** Ledeb. ex Nordm. 1837, Bull. Acad. Sci. Petersb. 2: 312.

Описан из Грузии. Л е с т о т у р у s (Chandjian, hoc loco; Kukkonen, 1975, in sched. herb. LE): «Transcaucasia, prov. Guria, Nordman» (LE!).

ЗЗ: Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

51 (161). **Otanthus** Hoffmanns. et Link

1 (650). **O. maritimus** (L.) Hoffmanns. et Link, 1809, Fl. Portug. 2: 365.

Описан по материалам из Европы. Т у р у s: Herb. Cliff., № 398/7 (BM).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион.

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

Subtrib. 2. **Chrysantheminae** O. Hoffm.

52 (162). **Leucanthemum** Mill.

1 (651). **L. vulgare** Lam. 1779, Fl. Fr. 2: 137.

Описан из Европы.

ЗП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.
Умеренная Евразия; Сев. Америка.

53 (163). *Matricaria* L.

1 (652). **M. recutita** L. 1753, Sp. Pl.: 891.

Описан из Европы.

ЗП; ВП: Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Сев., Юго-зап. (Турция, Ирак, Иран, Афганистан), Ср., Вост. Азия.

2 (653). **M. aurea** (Loefl.) Sch. Bip. 1860, Bonplandia, 8: 369. — *Cotula aurea* Loefl. 1758, Iter Hisp.: 163.

Описан из Испании.

ВК: Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Сирия, Палестина, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

3 (654). **M. matricarioides** (Less.) Porter, 1884, Mem. Torrey Bot. Club, 5: 341. — *Artemisia matricarioides* Less. 1831, Linnaea, 6: 210.

Описан по материалам с о-ва Уналашка и п-ова Камчатка.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг. Заносное.

Умеренная Евразия; Сев. Америка. В Европе — заносное.

54 (164). *Tripleurospermum* Sch. Bip.

Sect. 1. *Tripleurospermum*

1 (655). **T. inodorum** (L.) Sch. Bip. 1844, Tanacet.: 32. — *Matricaria inodora* L. 1755, Fl. Suec. ed. 2: 297.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК; ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг.; **T.**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 104).

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция), Ср. Азия.

2 (656). **T. tenuifolium** (Kit.) Freyn, 1888, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 38: 613. — *T. tzvelevii* Pobed. 1965, Новости сист. высш. раст. [2]: 241.

Описан из Европы.

ВП: Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.; **T.**

Центр., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).