

### Sect. 3. *Seriphidium* Bess.

18 (712). *A. szowitziana* (Bess.) Grossh. 1934, Фл. Кавк. 4: 142. — *A. maritima* L. var. *szowitziana* Bess. 1834, Bull. Soc. Nat. Moscou, 7: 34. — *A. prilipkoana* Rzazade, 1955, Изв. АН АзербССР, 3: 26. — *A. iskenderiana* Rzazade, 1955, цит. соч.: 27. — *A. kobstanica* Rzazade, 1955, цит. соч.: 25.

Описан из Восточного Закавказья. Т у р у s: «Salian ad litus meridionale maris Caspii, Hansen» (?).

**ЗП:** Аз-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Дар.

Эндемик.

19 (713). *A. taurica* Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1837. — *A. paucifloriformis* Rzazade, 1955, Изв. АН АзербССР, 3: 25.

Описан из Крыма. Т у р у s: «In Tauria» (B-WILLD, № 15398, photo — ERE!).

**ЗП; ВП; ЦК:** Малк.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Указан для **ЗК:** Уруп.-Теб.; **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 105).

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия (Турция).

20 (714). *A. fragrans* Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1835. — *A. erivanica* Grossh. 1934, Фл. Кавк. 4: 143. — *A. hanseniana* Grossh. 1934, цит. соч.: 146. — *A. meyeriana* Grossh. 1949, Опред. раст. Кавк.: 465. — *A. fedorovii* Rzazade, 1955, Изв. АН АзербССР, 3: 24.

Описан из Армении. Т у р у s: «In Armenia» (B-WILLD, № 15391, photo — ERE!).

**ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ; Т.**

Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

*A. fragrans* часто принимают за более или менее близкие виды *A. taurica* Willd., *A. maritima* L. и *A. santonica* L. Однако детальный анализ различных морфолого-анатомических признаков этих видов показал, что *A. fragrans*, несмотря на сильную полиморфность, довольно четко отличается от них рядом признаков (Габриэлян, Ханджян. 1986).

21 (715). *A. araxina* Takht. 1937, Тр. Бот. инст. Арм. фил. АН СССР, сер. биол., 2: 209. — *A. nachitschevanica* Rzazade, 1955, Изв. АН АзербССР, 3: 24. — *A. spicigera* auct. fl. Sauc. non C. Koch, 1841: Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 142; Поляков, 1961, Фл. СССР, 26: 620.

Описан из Армении. Т у р у s: «Daralaghez, in monte Pulur-Dagh (1000 m), 7 X 1935, A. Takhtajan» (LE!).

**ЮЗ:** Дар., Нах.

Эндемик.

### Trib. 7. *Senecioneae* Cass.

#### 57 (167). *Tussilago* L.\*

1 (716). *T. farfara* L. 1753, Sp. Pl.: 865.

Описан из Европы.

\* Ю. Л. Меницкий.

**ЗП:** З. Ставр; **ВП:** В. Ставр; **ЗК:** Адаг.-Пшиш, Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК:** **ВК:** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Мерг.-Зан.; **Т.**

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 194); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1934: 144; Манденова, 1952: 383; Софиева, 1961: 325); всех районов Армении (Манукян, 1995: 460).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр., Южн., Вост. Азия; заносное в Сев. Америке.

### 58 (168). *Petasites* Mill.\*

1 (717). **P. hybridus** (L.) Gaertn., В. Mey. et Scherb. 1801, Fl. Wetterau, 3: 184. — *Tussilago hybrida* L. 1753, Sp. Pl.: 866. — *Petasites officinalis* Moench, 1794, Meth.: 568. — *P. ochroleucus* Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. Sér. 2, 3: 5. — *P. georgicus* Manden. 1947, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 13: 76; Манден. 1952, Фл. Груз. 8: 386; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 466; Дмитриева, 1960, Опред. раст. Адж.: 268.

Описан из Европы.

**ЗП:** З. Ставр; **ЗК:** Адаг.-Пшиш, Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.

Указан для **ЦК:** В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 57); нижнего горного пояса всех лесных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 194); **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Ширв.; **Т.** (Гроссгейм, 1934: 144; Манукян, 1995: 462).

Европа (кроме крайнего севера); Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

2 (718). **P. albus** (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 406. — *Tussilago alba* L. 1753, Sp. Pl.: 866.

Описан из Европы.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1934: 144); нижнего горного пояса всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 195); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1934: 144; Манденова, 1952: 386; Манукян, 1995: 462).

Атл., Сев., Центр. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

3 (719). **P. fominii** Bordz. 1915, Зап. Киев. общ. естествоисп. 25: 123; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 144; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 465; Манден. 1952, Фл. Груз. 8: 385; Гагнидзе и Кем.-Нат. 1985, Бот. геогр. фл. Рача-Лечх.: 69. — *Nardostmia fominii* (Bordz.) Kurpian. 1961, Фл. СССР, 26: 648 (sine bas. et comb. nova).

Описан по культивировавшимся экземплярам, происходящим из Грузии (Гудаури).

**ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

\* Ю. Л. Меницкий, Г. Ю. Конечная.