

ЗП: З. Ставр; **ВП:** В. Ставр; **ЗК:** Адаг.-Пшиш, Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК:** **ВК:** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Мерг.-Зан.; **Т.**

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 194); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1934: 144; Манденова, 1952: 383; Софиева, 1961: 325); всех районов Армении (Манукян, 1995: 460).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр., Южн., Вост. Азия; заносное в Сев. Америке.

58 (168). *Petasites* Mill.*

1 (717). **P. hybridus** (L.) Gaertn., В. Mey. et Scherb. 1801, Fl. Wetterau, 3: 184. — *Tussilago hybrida* L. 1753, Sp. Pl.: 866. — *Petasites officinalis* Moench, 1794, Meth.: 568. — *P. ochroleucus* Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. Sér. 2, 3: 5. — *P. georgicus* Manden. 1947, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 13: 76; Манден. 1952, Фл. Груз. 8: 386; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 466; Дмитриева, 1960, Опред. раст. Адж.: 268.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр; **ЗК:** Адаг.-Пшиш, Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.

Указан для **ЦК:** В. Тер. (Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 57); нижнего горного пояса всех лесных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 194); **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Ширв.; **Т.** (Гроссгейм, 1934: 144; Манукян, 1995: 462).

Европа (кроме крайнего севера); Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

2 (718). **P. albus** (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 406. — *Tussilago alba* L. 1753, Sp. Pl.: 866.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1934: 144); нижнего горного пояса всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 195); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1934: 144; Манденова, 1952: 386; Манукян, 1995: 462).

Атл., Сев., Центр. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

3 (719). **P. fominii** Bordz. 1915, Зап. Киев. общ. естествоисп. 25: 123; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 144; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 465; Манден. 1952, Фл. Груз. 8: 385; Гагнидзе и Кем.-Нат. 1985, Бот. геогр. фл. Рача-Лечх.: 69. — *Nardosmia fominii* (Bordz.) Kurpian. 1961, Фл. СССР, 26: 648 (sine bas. et comb. nova).

Описан по культивированным экземплярам, происходящим из Грузии (Гудаури).

ЗЗ: Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

* Ю. Л. Меницкий, Г. Ю. Конечная.

Указан для **ЦК**: В. Тер. (Манденова, 1952: 385; Сахокиа, Хуцишвили, 1975: 57); **ЗЗ**: Туап.-Адл. (Галушко, 1980: 195).

Эндемик.

59 (169). *Doronicum* L.*

1 (720). *D. orientale* O. Hoffm. 1808, Comment. Soc. Phys.-Med. Univ. Moscou, 1: 8.

Описан из Грузии («Circa Mzhet in Iberia»).

ЗП: З. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб.; **ЦК**: В.-Тер.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Центр., Южн. и Юго-Вост. Европа; Средиз.

2 (721). *D. macrophyllum* Fisch. 1812, Catal. Jard. Pl. Gorenki: 40.

Описан с Центрального Кавказа. Т у р у с: «Caucasus, Beschtau, Hohenacker» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп.-Тeb.; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**; **ЦЗ**; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**.

Указан для **ЦЗ**: Лори; **ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Араг. (Манукян, 1995: 453). Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

3 (722). *D. balansae* Cavill. 1911, Ann. Cons. Jard. Bot. Genève, 13: 347.

Описан из Турции. Т у р у с: «Lasistania, in montibus prope Djimil (Cimil), 2100 m, 1866, Balansa» (G).

ЮЗЗ: Араг.

Указан для **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Занг. (Манукян, 1995: 456).

Юго-Зап. Азия (Турция).

4 (723). *D. oblongifolium* DC. 1838, Prodr. 6: 321.

Описан с Восточного Кавказа. Т у р у с: «In pratis alpinis Caucasi orientalis, С. А. Meyer» (G).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп.-Тeb.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: Асо-Арг., В. Сул.; **ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах., Занг., Ю. Караб.

Указан для **ЦЗ**: Лори; **ВЗ**: Мург.-Муровд. (Манукян, 1995: 456).

Юго-Зап. (Турция), Ср. Азия.

60 (170). *Senecio* L.**

Sect. 1. *Jacobaea* (Cass.) Dumort.

1 (724). *S. grandidentatus* Ledeb. 1845, Fl. Ross. 2: 636. — *S. arenarius* Bieb. ex Bess. 1816, Cat. Horto Cremen.: 129; Гросср. 1949, Опред. раст. Кавк.: 469, non Thunb. 1800. — *S. erucifolius* L. var. *canescens* Trautv. 1858, Mélang. Biol. 2: 130. — *S. erucifolius* L. var. *latilobus* Boiss. et var. *grandidentatus* (Ledeb.) Boiss. 1875,

* Г. Ю. Конечная.

** Ю. Л. Меницкий, Г. Ю. Конечная (Меницкий, Конечная, 2001).