

инст. АН АрмССР, 8: 39 (non vidi); Папава, 1952, Фл. Груз. 8: 429; Бобр. 1962, Фл. СССР, 27: 44. — *E. bannaticus* Rochel subsp. *quercifolius* Freyn, 1895, l. c. 3: 356. — *E. colchicus* Sosn. 1929, Журн. Русск. бот. общ. 14: 87; Sosn. ex Kem.-Nath. 1928, Вестн. Муз. Груз. 4: 138, nom. nud.; Колак. 1949, Фл. Абх. 4: 256; он же, 1982, цит. соч. изд. 2, 2: 55; Мулк. 1950, цит. соч.: 37; Папава, 1952, цит. соч.: 422; Дмитриева, 1960, Опред. раст. Адж.: 272; она же, 1990, цит. соч. изд. 2, 2: 45; Бобр. 1962, цит. соч.: 43; Гагнидзе и Кем.-Нат. 1985, Бот. геогр. фл. Рача-Лечх.: 66. — *E. bannaticus* auct. non Rochel: Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 438. — *E. sphaerocephalus* auct. non L.: Ильин, 1934, в Гроссг. Фл. Кавк. 4: 157.

Описан из Турции (Амасия). Тур у s: «In campibus ad occidentem montis Akdagh, 9 IX 1892, № 669, Manissadjian» (LD).

ВП: Тер.-Сулак. (пойма р. Аксай близ с. Аксай); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Хадыженск); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ЗК** (Галушко, 1980: 203); **ЦЗ;** **ВЗ:** Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ** (Гроссгейм, 1949: 471).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

68 (178). *Acantholepis* Less.

1 (779). **A. orientalis** Less. 1831, Linnaea, 6: 88. — *Echinops acantholepis* Jaub. et Spach, 1848, Ill. Pl. Or. 3: 99, tab. 273. — *E. olivieri* Jaub. et Spach, 1848, l. c.: tab. 274.

Описан из Ирака. Тур у s: «Inter Baghdad et Aleppo, Olivier et Bruguiere» (P).

ВЗ: Алаз.-Агрин., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Исаев, 1961: 354); **ЮЗ:** Дар. (Аревшатын, 1995: 226).

Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

Trib. 11. *Carlineae* Cass. (= *Cynareae* Less.)

Subtrib. 1. *Carlininae* (Cass.) Dumort.

69 (179). *Xeranthemum* L.*

1 (780). **X. annuum** L. 1753, Sp. Pl.: 857. — *X. radiatum* Lam. 1779, Fl. Fr. 2: 48. — *X. annettae* Kalen. 1834, Bull. Soc. Nat. Moscou, 7: 194.

Описан из Австрии. Л е с т о т у п у s (Burt in Jarvis et al. 1993: 99): Herb. Clifford: 400, *Xeranthemum* 1, sheet 1 (BM, № 000646992!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Асо-Арг. (сев.), В. Сулак. (сев.), Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.

Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан, Иран).

2 (781). **X. squarrosus** Boiss. 1845, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 6: 101.

Описан из Ирана. Л е с т о т у п у s (Линчевский, 1962: 64): «Gilan, № 4777, Aucher-Eloy» (G-BOISS!; isotypus — W!).

* Э. Ц. Габриэлян.

ЦК: В. Кум. (Пятигорск); **ВК:** Ассо-Агр. (Грозный), Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Адж. (Батуми); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх. (Ахалцихе), Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб. (юг); **Т.**

Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. (Копетдаг, Мангышлак, Шевченко) Азия.

3 (782). **X. inapertum** (L.) Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, № 2. — *X. annuum* L. var. *inapertum* L. 1753, Sp. Pl.: 858, p. p., excl. ic. in Moris: 1699, Pl. Hist. Univ. 3, 6: tab. 12, fig. 1. — *X. foetidum* Moench, 1794, Meth.: 582. — *X. erectum* C. Presl, 1822, in J. et C. Presl, Delic. Prag. 1: 106.

Описан из Западной Европы. *L e c t o t y p u s* (Hillard, Burt, 1981: 254): Löf-ling 621, Herb. Linn., № 990.2 (LINN).

ВК: Ман.-Самур. (Дербент), Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг. (Ширак); **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т** (Зуванд).

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, сев. Иран).

4 (783). **X. longipapposum** Fisch. et C. A. Mey. 1835, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 4: 337.

Описан из северо-западного Ирана. *T y p u s*: «Persia borealis, provincia Aderbeidshan, prope pagum Seidchodschi locis siccis, Szovits» (LE!).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах. (Казанчи), Араг. (между Баграван и Ани, г. Артени); **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Хачик, Джермук, Гндеваз), Нах.; **Т** (Зуванд).

Юго-Зап. (Турция, Ливан, Палестина, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

5 (784). **X. cylindraceum** Sm. 1813, in Sibth. et Sm. Fl. Graec. Prodr. 2: 172. — *X. annuum* L. var. *inapertum* L. 1753, Sp. Pl.: 858, p. p.

Описан из Турции. *T y p u s*: «In monte Olympio Bithyno (Ulu-Dag), Sibthorp» (OXF).

ЗП; ВП: Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж. (Батуми); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. **ВЗ; ЮЗ:** Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Израиль, Ирак, сев.-зап. Иран).

70 (180). **Chardinia** Desf. *

1 (785). **C. macrocarpa** C. Koch, 1851, Linnaea, 24: 382. — *C. orientalis* (L.) Kuntze var. *erivanica* Tamamsch. 1935, Feddes Repert. 38: 171 («*verivanica*»).

Описан из Армении. *T y p u s*: «*Xeranthemum armenum* fructu maximo Gundelsheimer herb.» (P-TOURN!).

ЮЗ: Ерев. (окр. Ацавана, Эребунийский заповедник, Урцский хр.), Дар. (между сс. Чива и Арени, окр. Ехегнадзора).

Юго-Зап. Азия (Турция: Ичель, Мардин, Ван; Сирия: север; Ирак).

* Э. Ц. Габриэлян.