

**ЦК:** В. Кум. (Пятигорск); **ВК:** Ассо-Агр. (Грозный), Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Адж. (Батуми); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх. (Ахалцихе), Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Мерг.-Зан., Ю. Караб. (юг); **Т.**

Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. (Копетдаг, Мангышлак, Шевченко) Азия.

3 (782). **X. inapertum** (L.) Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, № 2. — *X. annuum* L. var. *inapertum* L. 1753, Sp. Pl.: 858, p. p., excl. ic. in Moris: 1699, Pl. Hist. Univ. 3, 6: tab. 12, fig. 1. — *X. foetidum* Moench, 1794, Meth.: 582. — *X. erectum* C. Presl, 1822, in J. et C. Presl, Delic. Prag. 1: 106.

Описан из Западной Европы. *Lectotypus* (Hillard, Burt, 1981: 254): Löf-ling 621, Herb. Linn., № 990.2 (LINN).

**ВК:** Ман.-Самур. (Дербент), Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг. (Ширак); **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мерг.-Зан.; **Т** (Зуванд).

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, сев. Иран).

4 (783). **X. longipapposum** Fisch. et C. A. Mey. 1835, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 4: 337.

Описан из северо-западного Ирана. *Typus*: «Persia borealis, provincia Aderbeidshan, prope pagum Seidchodschi locis siccis, Szovits» (LE!).

**ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Казанчи), Араг. (между Баграван и Ани, г. Артени); **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Хачик, Джермук, Гндеваз), Нах.; **Т** (Зуванд).

Юго-Зап. (Турция, Ливан, Палестина, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

5 (784). **X. cylindraceum** Sm. 1813, in Sibth. et Sm. Fl. Graec. Prodr. 2: 172. — *X. annuum* L. var. *inapertum* L. 1753, Sp. Pl.: 858, p. p.

Описан из Турции. *Typus*: «In monte Olympio Bithyno (Ulu-Dag), Sibthorp» (OXF).

**ЗП; ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж. (Батуми); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. **ВЗ; ЮЗ:** Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Израиль, Ирак, сев.-зап. Иран).

## 70 (180). **Chardinia** Desf. \*

1 (785). **C. macrocarpa** C. Koch, 1851, Linnaea, 24: 382. — *C. orientalis* (L.) Kuntze var. *erivanica* Tamamsch. 1935, Feddes Repert. 38: 171 («*verivanica*»).

Описан из Армении. *Typus*: «*Xeranthemum armenum* fructu maximo Gundelsheimer herb.» (P-TOURN!).

**ЮЗ:** Ерев. (окр. Ацавана, Эребунийский заповедник, Урцский хр.), Дар. (между сс. Чива и Арени, окр. Ехегнадзора).

Юго-Зап. Азия (Турция: Ичель, Мардин, Ван; Сирия: север; Ирак).

\* Э. Ц. Габриэлян.

2 (786). **C. orientalis** (L.) Kuntze, 1887, Тр. Петерб. бот. сада, 10: 201. — *Xeranthemum annuum* L. var. *orientale* L. 1753, Sp. Pl.: 858. — *X. orientale* (L.) Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, № 3. — *Chardinia xeranthemoides* Desf. 1817, Мém. Mus. Hist. Nat. (Paris), 3: 455, tab. 21.

Описан из Армении (по сборам Турнефора). Neotypus (Hillard, Burt, 1981: 249): «Armenia» (P-TOURN, № 4768!).

**ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд. Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг. (Ширак., Апар.); **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.; **Т** (Зуванд).

Средиз. (восток); Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, сев. Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

### 71 (181). **Amphoricarpus** Vis.\*

1 (787). **A. elegans** Albov, 1894, Bull. Herb. Boiss. 2: 147. — *A. kuznetzowii* C. Winkl. et Lipsky, 1898, Тр. Петерб. бот. сада, 14, 2: 284. — *Alboviodoxa elegans* (Albov) Woronow, 1931, Sched. Herb. Fl. Cauc. 10: № 499, nom. nud.; Гросср. 1949, Опред. раст. Кавк.: 473; Колак. 1949, Фл. Абх. 4: 259; он же, 1982, цит. соч. изд. 2, 2: 15; Папава, 1952, Фл. Груз. 8: 435.

Описан из Западного Закавказья. Типус: «Plantes d' Abkhasie, Crête Bsybienne, défilé de Hetschi-gouâre, 1900 mètres, 2 X 1893, № 366, N. Alboff» (G; isotypus — LE!).

**ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.  
Эндемик.

### 72 (182). **Carlina** L.\*

1 (788). **C. vulgaris** L. aggr.

1а. **C. vulgaris** L. 1753, Sp. Pl.: 828.

Описан из Европы.

**ЗП; ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан.; **Т**.

Указан для всех горных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 204); **ВК:** Ассо-Арг. (Папава, 1952: 436); **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Иорск-Шек., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В.Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1934: 163; Папава, 1952: 436; Гаджиев, 1961: 358; Манукян, 1995: 236).

Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

1б. **C. biebersteinii** Bernh. ex Hornem. 1819, Suppl. Hort. Bot. Hafn.: 94. — *C. longifolia* Rchb. 1830, Pl. Crit. 8: 25; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 448; Гросср. 1934, Фл. Кавк. 4: 163; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 473; Папава, 1952, Фл. Груз. 8: 436; Дмитриева, 1960, Опред. раст. Адж.: 273; она же, 1990, цит. соч. изд. 2, 2: 46, non Viv. 1824. — *C. longicaulis* Sommier et Levier, 1895, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 2: 91.

\* Ю. Л. Меницкий.