

81 (191). *Picnomon* Adans.*

1 (939). **P. acarna** (L.) Cass. 1826, Dict. Sci. Nat. 40: 188. — *Carduus acarna* L. 1753, Sp. Pl.: 820. — *Cnicus acarna* (L.) L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1158. — *Cirsium acarna* (L.) Moench, 1802, Suppl. Meth.: 226. — *Carlina acarna* (L.) Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 282.

Описан из Испании.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВК:** Ман.-Самур, Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.; **Т:**

Указан для **ЗК;** **ЦК;** **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 220); **ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Занг., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1934: 190; Манукян, 1995: 307); всех районов Азербайджана (Гаджиев, 1961: 416).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Ср. Азия.

82 (192). *Lamyra* Cass.*

1 (940). **L. echinocephala** (Willd.) Tamamsch. 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 470. — *Cnicus echinocephalus* Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1685; Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 280. — *Cirsium echinocephalum* (Willd.) Fisch. 1812, Cat. Jard. Pl. Gorenki: 35; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 551. — *Chamaepeuce echinocephala* (Willd.) DC. 1838, Prodr. 6: 660; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 190; он же, 1949, Опред раст. Кавк.: 487; Харадзе, 1952, Фл. Груз. 8: 519. — *Cirsium wachtangii* Woronow, 1917, Изв. Кавк. муз. 11: 20. — *Chamaepeuce wachtangii* (Woronow) Grossh. 1934, цит. соч.: 190; Гроссг. 1949, цит. соч.: 487. — *Ptilostemon echinocephalus* (Willd.) Greuter, 1967, Boissiera, 13: 146; id. 1975, Fl. Turk. 5: 418; K. Werner, 1976, Fl. Eur. 4: 243; Цвел. 1994, Фл. европ. части СССР, 7: 248.

Описан из Крыма. Turus: «In saxosis Tauriae, Voeber» (B-WILLD).

ЗП: Уруп.-Теб.; **ЦК:** В. Кум.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт. Ю. Ос.

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

Приводимый Р. Е. Boissier (1875) как *Cirsium macrostachyum* Trautv., а позднее А. А. Гроссгеймом (1934) и И. И. Карягиным (1961) как *Chamaepeuce macrostachya* (Trautv.) Grossh. вид, описанный Е. Р. Trautvetter (1857) на основании образца «Schirwan, prope Aksu, Lagowsky», по мнению С. Г. Тамамшян (in litt. herb. LE), относится к западносредиземноморскому *Cirsium (Lamyra) casabonae* DC. и на Кавказе не встречается.

83 (193). *Silybum* Adans.*

1 (941). **S. marianum** (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 378. — *Carduus marianus* L. 1753, Sp. Pl.: 823. — *Cirsium maculatum* Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 2: 130.

Описан из Европы.

ЦК: В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур, Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

* Ю. Л. Меницкий.