

## 81 (191). *Picnomon* Adans.\*

1 (939). **P. acarna** (L.) Cass. 1826, Dict. Sci. Nat. 40: 188. — *Carduus acarna* L. 1753, Sp. Pl.: 820. — *Cnicus acarna* (L.) L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1158. — *Cirsium acarna* (L.) Moench, 1802, Suppl. Meth.: 226. — *Carlina acarna* (L.) Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 282.

Описан из Испании.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВК:** Ман.-Самур, Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.; **Т:**

Указан для **ЗК;** **ЦК;** **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 220); **ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Занг., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1934: 190; Манукян, 1995: 307); всех районов Азербайджана (Гаджиев, 1961: 416).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Ср. Азия.

## 82 (192). *Lamyra* Cass.\*

1 (940). **L. echinocephala** (Willd.) Tamamsch. 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 470. — *Cnicus echinocephalus* Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1685; Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 280. — *Cirsium echinocephalum* (Willd.) Fisch. 1812, Cat. Jard. Pl. Gorenki: 35; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 551. — *Chamaepeuce echinocephala* (Willd.) DC. 1838, Prodr. 6: 660; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 190; он же, 1949, Опред раст. Кавк.: 487; Харадзе, 1952, Фл. Груз. 8: 519. — *Cirsium wachtangii* Woronow, 1917, Изв. Кавк. муз. 11: 20. — *Chamaepeuce wachtangii* (Woronow) Grossh. 1934, цит. соч.: 190; Гроссг. 1949, цит. соч.: 487. — *Ptilostemon echinocephalus* (Willd.) Greuter, 1967, Boissiera, 13: 146; id. 1975, Fl. Turk. 5: 418; K. Werner, 1976, Fl. Eur. 4: 243; Цвел. 1994, Фл. европ. части СССР, 7: 248.

Описан из Крыма. Turus: «In saxosis Tauriae, Voeber» (B-WILLD).

**ЗП:** Уруп.-Теб.; **ЦК:** В. Кум.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт. Ю. Ос.

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

Приводимый Р. Е. Boissier (1875) как *Cirsium macrostachyum* Trautv., а позднее А. А. Гроссгеймом (1934) и И. И. Карягиным (1961) как *Chamaepeuce macrostachya* (Trautv.) Grossh. вид, описанный Е. Р. Trautvetter (1857) на основании образца «Schirwan, prope Aksu, Lagowsky», по мнению С. Г. Тамамшян (in litt. herb. LE), относится к западносредиземноморскому *Cirsium (Lamyra) casabonae* DC. и на Кавказе не встречается.

## 83 (193). *Silybum* Adans.\*

1 (941). **S. marianum** (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 378. — *Carduus marianus* L. 1753, Sp. Pl.: 823. — *Cirsium maculatum* Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 2: 130.

Описан из Европы.

**ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур, Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

\* Ю. Л. Меницкий.

Указан для **ЗП**; **ВК**: В. Сулак. (Галушко, 1980: 220); **ЗЗ**: Абх.; **ВЗ**: Алаз.-Агринч., Мург.-Муровд.; **Т** (Гроссгейм, 1934: 191; Думбадзе, 1952: 521; Гаджиев, 1961: 419; Аревшатян, 1995: 305).

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа (натурализовался); Средиз.; Сев. (натурализовался), Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия; Сев. Америка.

## 84 (194). *Onopordum* L.\*

### Sect. 1. *Onopordum*

1 (942). *O. acanthium* L. 1753, Sp. Pl.: 827.

Описан из Европы.

**ЗП**; **ВП**; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ**: Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан, Дар., Нах., Занг., Мерг.-Зан.; **Т**.

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980б: 221), всех районов Азербайджана и Армении (Гаджиев, 1961: 421; Аревшатян, 1995: 365).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак), Ср. Азия.

2 (943). *O. cinereum* Grossh. 1920, Тр. Тифл. бот. сада, сер. 2, 1: 38. — *O. acanthium* L. var. *cinereum* Hohen. in sched. herb. LE. — *O. acanthium* auct. fl. Cauc. non L.

Описан из Талыша. Т у р у s: «In ditione Talysch, in montibus siccis, 3–6000', Grossheim, Pastuchow» (ТВИ).

**ВК**: Кубин.; **ЮЗ**: Караб.; **Т**.

Указан для **ЮЗ**: Дар., Занг., Мерг.-Зан. (Аревшатян, 1995: 265).

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

3 (944). *O. tauricum* Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1687. — *O. elatum* Sm. 1813, in Sibth. et Sm. Fl. Graec. Prodr. 2: 156. — *O. virens* DC. 1815, Fl. Fr. ed. 3, 5: 456.

Описан из Крыма («in Tauria»).

**ВП**: Тер.-Кум. (с/х «Червленые буруны», Караногайский р-н, Грозненская обл.).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

### Sect. 2. *Erecta* Rouy

4 (945). *O. heteracanthum* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 68.

Описан из Талыша. Т у р у s: «In campis et collibus siccis lapidosis pr. pagum Swant, 25 VI 1830, № 126 [C. A. Meyer]» (LE!).

**ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ**: Нах.; **Т**.

Указан для **ВЗ**: Иорск.-Шек.; **ЮЗ**: Ю. Караб. (Гаджиев, 1961: 420).

Юго-Зап. Азия (Иран).

---

\* Ю. Л. Меницкий.