

Указан для **ЗП**; **ВК**: В. Сулак. (Галушко, 1980: 220); **ЗЗ**: Абх.; **ВЗ**: Алаз.-Агринч., Мург.-Муровд.; **Т** (Гроссгейм, 1934: 191; Думбадзе, 1952: 521; Гаджиев, 1961: 419; Аревшатян, 1995: 305).

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа (натурализовался); Средиз.; Сев. (натурализовался), Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия; Сев. Америка.

84 (194). *Onopordum* L.*

Sect. 1. *Onopordum*

1 (942). *O. acanthium* L. 1753, Sp. Pl.: 827.

Описан из Европы.

ЗП; **ВП**; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ**: Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан, Дар., Нах., Занг., Мерг.-Зан.; **Т**.

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980б: 221), всех районов Азербайджана и Армении (Гаджиев, 1961: 421; Аревшатян, 1995: 365).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак), Ср. Азия.

2 (943). *O. cinereum* Grossh. 1920, Тр. Тифл. бот. сада, сер. 2, 1: 38. — *O. acanthium* L. var. *cinereum* Hohen. in sched. herb. LE. — *O. acanthium* auct. fl. Cauc. non L.

Описан из Талыша. Т у р у s: «In ditione Talysch, in montibus siccis, 3–6000', Grossheim, Pastuchow» (ТВИ).

ВК: Кубин.; **ЮЗ**: Караб.; **Т**.

Указан для **ЮЗ**: Дар., Занг., Мерг.-Зан. (Аревшатян, 1995: 265).

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

3 (944). *O. tauricum* Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1687. — *O. elatum* Sm. 1813, in Sibth. et Sm. Fl. Graec. Prodr. 2: 156. — *O. virens* DC. 1815, Fl. Fr. ed. 3, 5: 456.

Описан из Крыма («in Tauria»).

ВП: Тер.-Кум. (с/х «Червленые буруны», Караногайский р-н, Грозненская обл.).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 2. *Erecta* Rouy

4 (945). *O. heteracanthum* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 68.

Описан из Талыша. Т у р у s: «In campis et collibus siccis lapidosis pr. pagum Swant, 25 VI 1830, № 126 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ**: Нах.; **Т**.

Указан для **ВЗ**: Иорск.-Шек.; **ЮЗ**: Ю. Караб. (Гаджиев, 1961: 420).

Юго-Зап. Азия (Иран).

* Ю. Л. Меницкий.

5 (946). **O. armenum** Grossh. 1920, Тр. Тифл. бот. сада, сер. 2, 1: 40. — ? *O. candidum* Nábělek, 1925, Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk (Brno), 52, 2: 35; Тамамш. 1963, Фл. СССР, 28: 238; Danin, 1975, Fl. Turk. 5: 360. — *O. frickii* Tamamsch. 1963, Фл. СССР, 28: 605, 236.

Описан из Южного Закавказья. Тур у s: «In Armenia, pr. Erivan, prope pagum Dzhirvisch, 4000', in incultis et ruderatis, 17 VIII, Grossheim» (ТВИ).

ВЗ: Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Ю. Караб.

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Аревшатын, 1995: 265).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, зап. Иран).

А. Danin (1975: 356) разделяет *O. armenum* и *O. candidum* по размерам остроконечий на листочках обертки (1–2 мм и 3–5 мм соответственно) и наличию паутинистого опушения у обертки *O. candidum*. У просмотренных нами образцов степень опушенности обертки сильно варьирует, на что указывала и И. Г. Аревшатын (1995: 265), и, кроме того, отсутствует корреляция этого признака с длиной остроконечий.

85 (195). **Ancathia** DC.*

1 (947). **A. igniaria** (Spreng.) DC. 1833, in Guill. Arch. Bot. 2: 332; Гросср. 1934, Фл. Кавк. 4: 191; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 487; Тамамш. 1963, Фл. СССР, 28: 222; Гаджиев, 1961, Фл. Азерб. 8: 416; Галушко, 1980, Фл. Сев. Кавк. 3: 220. — *Cirsium igniarium* Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 375. — *Cnicus igniarius* Benth. 1873, in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2, 1: 468. — *Ancathia daghestanica* Tamamsch. 1953, in sched. herb. LE.

Описан с Казахского мелкосопочника («Ditio Kirgisorum austr. (*Carduus igniarius* Pall., *elegans* W. herb.)»). Л е с т о т и п у s (Tatanov, hoc loco): «*Carduus igniarius*, in Campis australioribus kirgisorum» (B-WILLD, № 14895; isolectotypus — LE!).

ВК: В. Сулак. (сев.), Ман.-Самур.

Указан для **ВК:** Кубин. (сел. Арабдачня) (Гаджиев, 1968: 417).

Сев. (юго-вост. Зап. и юго-зап. Вост. Сибири), Ср. (вост. Казахстан), Центр. (сев.-зап. и зап. Монголия; Китай: Джунгария) Азия.

Указание (Тамамшян, 1963; Тамамшян, Мурадян, 1983 и др.) на то, что вид описан с Алтая, ошибочно. С. Sprengel (1826: 375) описал его как *Cirsium igniarium* Spreng. по гербарному образцу из Гербария С. L. Willdenow, собранному, согласно этикетке, на юге ист. области Киргизская степь. В протологе указано, что название виду *Carduus igniarius* дал П. С. Паллас (in sched.). В Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова хранится один типовой образец, снабженный этикеткой с надписью «*Carduus igniarius*», сделанной Палласом. В качестве лектотипа нами выбран образец, хранящийся в Гербарии Берлин-Далема и имеющий этикетку, содержание которой более полно соответствует протологу.

Полиморфный вид, варьирующий по длине и ширине листьев, степени завернутости их краев и форме и выгнутости верхушки (Тамамшян, Мурадян, 1983).

* И. В. Татанов.