

Subtrib. 3. *Centaureinae* Dumort.

86 (196). *Serratula* L.*

1 (948). *S. coronata* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1144. — *Mastrucium pinnatifidum* Cass. 1825, Dict. Sci. Nat. 35: 173.

Описан по материалам из Сибири и Европы.

ЦК: В. Кум. (гора Бештау); **ЦЗ:** Лори (с. Гер-Гер).

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** В. Сулак.; **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Галушко, 1980: 222).

Центр., Вост. Европа; Сев., Ср., Вост. Азия.

2 (949). *S. erucifolia* (L.) Boriss. 1963, Фл. СССР, 28: 270. — *Xeranthemum erucifolium* L. 1753, Sp. Pl.: 858. — *Serratula xeranthemoides* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 265.

Описан из бассейна р. Дон.

ЗП; ВП; ВК: Ассо-Арг. (сев.), В. Сулак. (сев.), Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг.

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (вост. Турция), Ср. Азия.

3 (950). *S. radiata* (Waldst. et Kit.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 545. — *Carduus radiatus* Waldst. et Kit. 1800, Pl. Rar. Hung. 1: tab. 11. — *Serratula radiata* (Waldst. et Kit.) Bieb. subsp. *biebersteiniana* Pjin ex Grossh. 1934, Фл. Кавк. 4: 194. — *S. biebersteiniana* (Pjin ex Grossh.) Takht. 1946, в Тахт. и Фёд. Фл. Ерев.: 323.

Описан из Венгрии.

ЗП: З. Ставр. (юг); **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб. (Армавир), Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел. (Новороссийск); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т** (Зуванд).

Центр. Европа; Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

4 (951). *S. haussknechtii* Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 589. — *S. nudicaulis* (L.) DC. subsp. *haussknechtii* (Boiss.) Bornm. var. *transcaucasica* Bornm. 1914, Вестн. Тифл. бот. сада, 32: 2. — *S. transcaucasica* (Bornm.) Sosn. ex Grossh. 1934, Фл. Кавк. 4: 194. — *Centaurea albinervis* Parsa, 1949, Kew Bull. 1948: 201.

Описан из северного Ирака. Т у р у s: «Montes Avroman et Schahu, 3050 m, VII 1867, № 578, Haussknecht» (G-BOISS!; isotypus — K!).

ВК: В. Сулак., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах.; **Т** (Зуванд).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, Ирак, сев. Иран).

5 (952). *S. coriacea* Fisch. et C. A. Mey. ex DC. 1838, Prodr. 6: 668. — *Centaurea strictissima* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 130.

Описан по материалам из Южного Закавказья и северного Ирана. С у п т у р i: «In glareosis et lapidosis prov. Aderbaischan et Nakitschevan, Szovits» (K!); «In Persia, № 3202, Aucher» (G-DC!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Занг.

* Э. Ц. Габриэлян.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. и центр. Иран).

Во «Flora Iranica» (К. Н. Rechinger, 1980) по ошибке цитируется тип *S. serratuloides* (Fisch. et C. A. Mey. ex DC.) Takht.

6 (953). **S. quinquefolia** Bieb. ex Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1639. — *Klasea quinquefolia* (Bieb. ex Willd.) Cass. 1825, Dict. Sci. Nat. 35: 173.

Описан с Кавказа. Т у р у s: «In Caucasi nemoribus, Bieberstein» (LE!).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд. (Иджев.), Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг. (Ширак); **ЮЗ:** Ерев., Дар., Занг.; **Т.**

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев.-зап. Иран).

7 (954). **S. serratuloides** (Fisch. et C. A. Mey. ex DC.) Takht. 1946, в Тахт. и Фёд. Фл. Ерев.: 323. — *Leuzea serratuloides* Fisch. et C. A. Mey. ex DC. 1838, Prodr. 6: 666. — *L. sclerophylla* Boiss. et Heldr. ex Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 10: 97. — *Phaeorappus freynii* Sint. ex Freyn, 1892, Österr. Bot. Zeitschr. 42: 235.

Описан из Южного Закавказья. Т у р у s: «In declivitatibus montium vallis Koschadara prov. Nakitschevan Pers.-Ross., Szovits» (LE!; isotypus — K!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Занг.

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран).

8 (955). **S. caucasica** Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 590. — *S. cichoracea* (L.) DC. 1838, Prodr. 6: 670, p. p., excl. typo. — *Centaurea cichoracea* Steven, 1813, Mém. Soc. Nat. Moscou, 4: 66, non L.

Описан с Восточного Кавказа. Т у р у s: «In agris otiosis Caucasi orientalis subalpini Kubensis circa pagum Soygyb et supra Chinalug, Steven» (G-DC!).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.

Эндемик.

87 (197). **Stemmacantha** Cass.*

1 (956). **S. pulchra** (Fisch. et C. A. Mey.) Dittrich, 1984, Candollea, 39: 48. — *Rhaponticum pulchrum* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 35. — *R. zardabii* Rzazade, 1958, Докл. АН АзербСССР, 14, 3: 241. — *Leuzea pulchra* (Fisch. et C. A. Mey.) Holub, 1973, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 8: 392.

Описан из Талыша. Т у р у s: «Talysch, Hoßenacker» (LE!; isotypi — G-DC!, GOET).

ЦК: В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин. (Конахкенд); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Цагвери, Атени); **Т.**

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран).

2 (957). **S. serratuloides** (Georgi) Dittrich, 1984, Candollea, 39: 49. — *Centaurea serratuloides* Georgi, 1775, Bemerk. Reise Russ. Reich. 1: 231. — *Leuzea salina* Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 382. — *Rhaponticum salinum* (Spreng.) Less. 1835, Linnaea, 9: 179. — *R. serratuloides* (Georgi) Bobr. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20: 19.

* Э. Ц. Габриэлян.