

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. и центр. Иран).

Во «Flora Iranica» (К. Н. Rechinger, 1980) по ошибке цитируется тип *S. serratuloides* (Fisch. et C. A. Mey. ex DC.) Takht.

6 (953). **S. quinquefolia** Bieb. ex Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1639. — *Klasea quinquefolia* (Bieb. ex Willd.) Cass. 1825, Dict. Sci. Nat. 35: 173.

Описан с Кавказа. Т у р у s: «In Caucasi nemoribus, Bieberstein» (LE!).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд. (Иджев.), Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг. (Ширак); **ЮЗ:** Ерев., Дар., Занг.; **Т.**

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев.-зап. Иран).

7 (954). **S. serratuloides** (Fisch. et C. A. Mey. ex DC.) Takht. 1946, в Тахт. и Фёд. Фл. Ерев.: 323. — *Leuzea serratuloides* Fisch. et C. A. Mey. ex DC. 1838, Prodr. 6: 666. — *L. sclerophylla* Boiss. et Heldr. ex Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 10: 97. — *Phaeorappus freynii* Sint. ex Freyn, 1892, Österr. Bot. Zeitschr. 42: 235.

Описан из Южного Закавказья. Т у р у s: «In declivitatibus montium vallis Koschadara prov. Nakitschevan Pers.-Ross., Szovits» (LE!; isotypus — K!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Занг.

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран).

8 (955). **S. caucasica** Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 590. — *S. cichoracea* (L.) DC. 1838, Prodr. 6: 670, p. p., excl. typo. — *Centaurea cichoracea* Steven, 1813, Mém. Soc. Nat. Moscou, 4: 66, non L.

Описан с Восточного Кавказа. Т у р у s: «In agris otiosis Caucasi orientalis subalpini Kubensis circa pagum Soygyb et supra Chinalug, Steven» (G-DC!).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.

Эндемик.

87 (197). **Stemmacantha** Cass.*

1 (956). **S. pulchra** (Fisch. et C. A. Mey.) Dittrich, 1984, Candollea, 39: 48. — *Rhaponticum pulchrum* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 35. — *R. zardabii* Rzazade, 1958, Докл. АН АзербСССР, 14, 3: 241. — *Leuzea pulchra* (Fisch. et C. A. Mey.) Holub, 1973, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 8: 392.

Описан из Талыша. Т у р у s: «Talysch, Hoßenacker» (LE!; isotypi — G-DC!, GOET).

ЦК: В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин. (Конахкенд); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Цагвери, Атени); **Т.**

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран).

2 (957). **S. serratuloides** (Georgi) Dittrich, 1984, Candollea, 39: 49. — *Centaurea serratuloides* Georgi, 1775, Bemerk. Reise Russ. Reich. 1: 231. — *Leuzea salina* Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 382. — *Rhaponticum salinum* (Spreng.) Less. 1835, Linnaea, 9: 179. — *R. serratuloides* (Georgi) Bobr. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20: 19.

* Э. Ц. Габриэлян.

Описан из Сибири. Т у р u s: J. G. Gmel. 1749, Fl. Sib. 2: tab. 37.

ЗП: Аз.-Куб. (окр. ст. Ясенская).

Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

88 (198). *Acroptilon* Cass.*

1 (958). **A. repens** (L.) DC. 1838, Prodr. 6: 663. — *Centaurea repens* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1293.

Описан с «Востока». Т у р u s: «Ex Oriente» (LINN, № 1030/34).

ЗП; ВП; ЦК: В. Кум., Малк.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси); **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мерг.-Зан. (зап.).

Вост. Европа (юг); Сев., Юго-Зап. (Турция, сев. Ирак, Иран, Афганистан), Ср., Центр. (Монголия) Азия.

89 (199). *Callicephalus* C. A. Mey.*

1 (959). **C. nitens** (Bieb.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 66. — *Centaurea nitens* Bieb. ex Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 2505. — *Serratula nitens* (Bieb. ex Willd.) Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 389.

Описан с Кавказа. Т у р u s: «In sabulosis ad Caucasum» (LE!).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Занг., Мерг.-Зан.

Юго-Зап. (сев.-вост. Турция: Артвин, Ардануч; сев.-зап. и сев. Иран), Ср. (Копетдаг) Азия.

90. (200). *Amberboa* (Pers.) Less.*

1 (960). **A. moschata** (L.) DC. 1838, Prodr. 6: 560, quoad bas. — *Centaurea moschata* L. 1753, Sp. Pl.: 909, excl. var. *amberboi* L. — *Amberboa odorata* DC. var. *floribus-rubicundis* Ledeb. 1845, Fl. Ross. 2: 683. — *A. glauca* auct. non Grossh.: Ильин, 1932, Изв. Бот. сада АН СССР, 30, 1–2: 111, excl. subsp.; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 196; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 489, р. р.; Агадж. 1961, Фл. Азерб. 8: 431, р. р.

Описан по культивируемым экземплярам, происходящим, по-видимому, из Армении. L e c t o t y p u s (Gabrielian, Jarvis, 1996: 214): «Cyanus orientalis major moschatus, flore purpureo et albo» in: Morison, 1699, Pl. Hist. Univ. 3: 135, sect. 7, tab. 25, fig. 5.

ЮЗ: Ерев. (Араратская долина, за исключением крайнего юго-востока).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, бассейн р. Аракс).

К. Линней, описывая *Centaurea moschata*, ссылается на «Hort. Cliff. 420» Hort. ups. 271. Roy.-Jugdb. 138, а также на таблицу в книге R. Morison (1699, l. c.). Исследование гербариев Линнея (LINN) и G. Clifford (BM) в Лондоне не выявило типичных образцов

* Э. Ц. Габриэлян.