

Описан из Сибири. Т у р u s: J. G. Gmel. 1749, Fl. Sib. 2: tab. 37.

ЗП: Аз.-Куб. (окр. ст. Ясенская).

Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

88 (198). *Acroptilon* Cass.*

1 (958). **A. repens** (L.) DC. 1838, Prodr. 6: 663. — *Centaurea repens* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1293.

Описан с «Востока». Т у р u s: «Ex Oriente» (LINN, № 1030/34).

ЗП; ВП; ЦК: В. Кум., Малк.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси); **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мерг.-Зан. (зап.).

Вост. Европа (юг); Сев., Юго-Зап. (Турция, сев. Ирак, Иран, Афганистан), Ср., Центр. (Монголия) Азия.

89 (199). *Callicephalus* C. A. Mey.*

1 (959). **C. nitens** (Bieb.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 66. — *Centaurea nitens* Bieb. ex Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 2505. — *Serratula nitens* (Bieb. ex Willd.) Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 389.

Описан с Кавказа. Т у р u s: «In sabulosis ad Caucasum» (LE!).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Занг., Мерг.-Зан.

Юго-Зап. (сев.-вост. Турция: Артвин, Ардануч; сев.-зап. и сев. Иран), Ср. (Копетдаг) Азия.

90. (200). *Amberboa* (Pers.) Less.*

1 (960). **A. moschata** (L.) DC. 1838, Prodr. 6: 560, quoad bas. — *Centaurea moschata* L. 1753, Sp. Pl.: 909, excl. var. *amberboi* L. — *Amberboa odorata* DC. var. *floribus-rubicundis* Ledeb. 1845, Fl. Ross. 2: 683. — *A. glauca* auct. non Grossh.: Ильин, 1932, Изв. Бот. сада АН СССР, 30, 1–2: 111, excl. subsp.; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 196; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 489, р. р.; Агадж. 1961, Фл. Азерб. 8: 431, р. р.

Описан по культивируемым экземплярам, происходящим, по-видимому, из Армении. L e c t o t y p u s (Gabrielian, Jarvis, 1996: 214): «Cyanus orientalis major moschatus, flore purpureo et albo» in: Morison, 1699, Pl. Hist. Univ. 3: 135, sect. 7, tab. 25, fig. 5.

ЮЗ: Ерев. (Арагатская долина, за исключением крайнего юго-востока).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, бассейн р. Аракс).

К. Линней, описывая *Centaurea moschata*, ссылается на «Hort. Cliff. 420» Hort. ups. 271. Roy.-Jugdb. 138, а также на таблицу в книге R. Morison (1699, l. c.). Исследование гербариев Линнея (LINN) и G. Clifford (BM) в Лондоне не выявило типичных образцов

* Э. Ц. Габриэлян.