

4 (1970). **G. caroli-henrici** (Gabrieljan et Dittrich) Gabrieljan, 1995, Фл. Арм. 9: 332. — *Centaurea caroli-henrici* Gabrieljan et Dittrich, 1993, Candollea, 48: 245.

Описан из Южного Закавказья. Т у р у s: «Armenia, Vaikh distr., near Djermuk, subalpine meadow below a forest of *Quercus macranthera*, 12 VII 1989, alt. 2100 m, Gabrielian et Dittrich» (G!; isotypi — В, ERE!, LE!).

ЮЗ: Дар. (Джермук, Кущи).

Эндемик Армении.

Этот вид, описанный в честь выдающегося австрийского ботаника К. Н. Rechinger, по-видимому, является стабилизированным межродовым гибридом, образующим многочисленные жизнеспособные семянки и сочетающим в себе признаки, сближающие его как с видами *Grossheimia*, так и *Chartolepis*. Этот факт еще раз свидетельствует о весьма близком родстве вышеуказанных групп. Впервые *G. caroli-henrici* был собран А. Л. Тахтаджяном и Э. Ц. Габриэлян в августе 1978 г. в окрестностях Джермука, позже с М. Dittrich там же.

92 (202). **Chartolepis** Cass.*

1 (1971). **C. glastifolia** (L.) Cass. 1829, Dict. Sci. Nat. 54: 492. — *Centaurea glastifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 915. — *Chartolepis tournefortii* Jaub. et Spach, 1847, Ill. Pl. Or. 3: 9. — *Centaurea tournefortii* (Jaub. et Spach) Walp. 1849, Ann. Bot. Syst. 1: 448.

Описан из исторической Армении («*Centaureum majus Armenum glastifolio*, Tournefort»). *L e c t o t y p u s* (Wagenitz in Jarvis, Turland, 1998: 421): Herb. Clifford, *Centaurea* 8, sheet A (BM, № 000647258!).

ЦЗ: Карг.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар. Юго-Зап. Азия (вост. Турция, зап. Иран).

2 (1972). **C. biebersteinii** Jaub. et Spach, 1847, Ill. Pl. Or. 3: 11, tab. 208, p. p. — *Centaurea biebersteinii* (Jaub. et Spach) Walp. 1849, Ann. Bot. Syst. 1: 448. — *C. glastifolia* L. var. *biebersteinii* (Jaub. et Spach) Gugler, 1908, Ann. Hist.-Nat. Mus. Hung. 6: 239.

Описан с Кавказа. *S y n t y p i*: «*Ex planitiebus caucasicis*, Herb. Bieb.» (P!, LE!).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах., Араг; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар.; **Т** (Зуванд).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция: Карс, Сарыкамыш, Кагызман; сев.-зап. Иран: Карадаг).

3 (1973). **C. intermedia** Boiss. 1856, Diagn. Pl. Or. Sér. 2, 3: 64. — *C. biebersteinii* Jaub. et Spach, 1847, Ill. Pl. Or. 3: 11, p. p. — *Centaurea glastifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 915, p. p., excl. typo. — *C. glastifolia* L. var. *intermedia* (Boiss.) Gugler, 1908, Ann. Hist.-Nat. Mus. Hung. 6: 239.

Описан по материалам из Восточной Европы, Сибири и Джунгарии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум.

Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

4 (1974). **C. pterocaula** (Trautv.) Czer. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20: 463. — *Centaurea pterocaula* Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2: 552, excl. syn., non

* Э. Ц. Габриэлян.

Romel, 1874. — *C. finitima* Bordz. 1912, Тр. Бот. сада Юрьев. унив. 13: 24. — *Chartolepis finitima* (Bordz.) Pjin, 1932, Изв. Бот. сада АН СССР, 30, 3–4: 353.

Описан из «Турецкой Армении». Т у р у s: «In Armenia, in tractu pascuo dicta Kasikibaran (Kasikoparan), 28 VI 1871, № 525, G. Radde» (LE!; isotypi — ТВИ!, ТGM!).

ВЗ: Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг. Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

93 (203). *Psephellus* Cass.*

Subgen. 1. *Heterolophus* (Cass.) Mikheev comb. nova.

— *Heterolophus* Cass. 1827, Dict. Sci. Nat. 50: 250.

Т у р у s: *P. sibiricus* (L.) Wagenitz (= *Centaurea sibirica* L.).

Sect. 1. *Heterolophus*

1 (975). **P. marschallianus** (Spreng.) C. Koch, 1851, Linnaea, 24: 438. — *Centaurea marschalliana* Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 398; Клоков, 1963, Фл. СССР, 28: 466. — *Psephellus annae* Galushko, 1979, Фл. Сев. Кавк. и вопр. ее истории, 3: 59. — *Centaurea annae* (Galushko) Czer. 1981, Сосуд. раст. СССР: 91. — *Psephellus marschallianus* (Spreng.) Mikheev, 1996, Бот. журн. 81, 7: 112, comb. superfl.

Описан по материалам из «Подолии» и с Кавказа. Л е с т о т у р у s (Михеев, 1996: 112; Попова, in sched. herb. LE): «...ex saxose circa Stauropolin, 1818, Bieberstein» (LE!).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** В. Кум. (Пятигорье)
Юго-Вост., Вост. Европа.

Sect. 2. *Schistosi* Alieva

2 (976). **P. hymenolepis** (Trautv.) Boiss. 1888, Fl. Or. Suppl.: 312; Софиева, 1961, Фл. Азерб. 8: 444. — *Centaurea hymenolepis* Trautv. 1875, Тр. Петерб. бот. сада, 3: 272; Сосн. 1963, Фл. СССР, 28: 433. — *C. schistosa* Sosn. 1963, Фл. СССР, 28: 611, 433.

Описан из Дагестана. Т у р у s: «Daghestania, inter Kurach et Kro, 1872, № 241, A. Becker» (LE!).

БК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв.
Эндемик.

3 (977). **P. boissieri** (Sosn.) Sosn. aggr.

За. **P. boissieri** (Sosn.) Sosn. 1948, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 14: 11; Сосн. 1952, Фл. Груз. 8: 539. — *P. hymenolepis* (Trautv.) Boiss. var. *boissieri* Sosn. 1934, в Гроссг. Фл. Кавк. 4: 198. — *Centaurea edmondii* Sosn. 1963, Фл. СССР, 28: 432.

* Э. Ц. Габриэлян (Закавказье, Малый Кавказ) (Габриэлян, 1995), А. Д. Михеев (Предкавказье, Большой Кавказ) (Михеев, 1996).