

ticus Khokhr. 1992, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 97, 6: 97. — *Aetheorappus pulcherrimus* auct. non (Willd.) Cass.: Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 603; Гросср. 1934, Фл. Кавк. 4: 204; он же, 1949, цит. соч.: 493.

Описан с Терека (Казбегский район Грузии). Т у р у s: «ГССР, Казбегский район, вершина Кассары, на щебнистых местах, 12 VIII 1936, А. Харадзе» (ТВИ).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Инг.-Рион., Рион-Квир., Адж.; **ВЗ.**

Указан для **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 224).

Эндемик.

3 (1006). **A. vvedenskii** (Sosn.) Sosn. 1952, Фл. Груз. 8: 550; Сосн. 1963, Фл. СССР, 28: 354. — *Psephellus vvedenskii* Sosn. 1934, в Гросср. Фл. Кавк. 4: 201; Сосн. 1948, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 14: 13.

Описан с Западного Кавказа. Т у р у s: «Кубанская обл., гора Большой Бамбак, юго-восточный склон, близ П[алатки] — наивысшей отм. горы Б. Бамбак, 9 VIII 1930, leg. Н. Введенский» (ТВИ; isotypus — LE!).

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Куб., Малк.

Эндемик.

95 (205). *Cheirolepis* Boiss.*

1 (1007). **C. persica** Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 10: 108. — *Phaeorappus kotschyi* (Boiss. et Heldr.) Boiss. var. *persicus* (Boiss.) Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 595. — *Centaurea kotschyi* (Boiss. et Heldr.) Hayek var. *persica* (Boiss.) Wagenitz, 1963, Bot. Jahrb. 82: 169. — *Phaeorappus cheirolophus* Boiss. ex Grossh. 1934, Фл. Кавк. 4: 205, nom. illeg. — *Cheirolepis kotschyi* Boiss. et Heldr. subsp. *persica* (Boiss.) Takht. 1972, в Тахт. и Фёд. Фл. Ерев.: 299.

Описан из северного Ирана. Т у р у s: «In declivibus meridiem versus spectantibus ad radices m. Demavend pr. pagum Ask, 30 VII 1843, Th. Kotschy, Pl. Pers. bor. 629» (G!; isotypi — BM!, GOET, E!, JE, LE!, W!).

ЮЗЗ: Араг. (Ширак, Нор-Амберд); **ЮЗ:** Ерев. (г. Еранос, г. Котуц, Веди, Урцский хр.), Дар. (Чива, Арени, Ехегнадзор, Хачик), Нах. (с. Бузгов).

Юго-Зап. Азия (Иран).

96 (206). *Tomanthea* DC.*

1 (1008). **T. spectabilis** (Fisch. et C. A. Mey.) Takht. 1939, Тр. молод. науч. работн. Арм. фил. АН СССР: 241, р. р. — *Psephellus spectabilis* Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 43. — *Amberboa spectabilis* (Fisch. et C. A. Mey.) DC. 1838, Prodr. 6: 561. — *Phaeorappus spectabilis* (Fisch. et C. A. Mey.) Boiss. 1845, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 6: 124. — *P. armenus* Jaub. et Spach, 1847, Ill. Pl. Or. 3: 13. — *Centaurea spectabilis* (Fisch. et C. A. Mey.) Sch. Bip. 1847, Linnaea, 19: 326. — *C. armena* (Jaub. et Spach) Rech. f. et Köie, 1955, Dansk. Biol. Skr. 8, 2: 184 (Symb. Afgh. II).

Описан из Южного Закавказья. Т у р у s: «Prov. Karabach (Nachitschevan), in herbidis vallis Koschadara, № 482, Szovits» (LE!; isotypi — G-DC!, K!, LE!, TBI!, W!).

* Э. Ц. Габриэлян.