

обнаружен в Армении на интереснейшем во флористическом отношении Урцском хребте, где произрастают три небольшие популяции этого вида (около 50 растений в каждой). По всей вероятности, ущелье, в устье которого находятся эти популяции, является своеобразным рефугиумом для целого ряда очень редких исчезающих видов, имеющих дизъюнктивный ареал и занесенных в Красную книгу Армении.

97 (207). *Stizolophus* Cass.*

1 (1012). *S. balsamita* (Lam.) Cass. ex Takht. 1946, в Тахт. и Фёд. Фл. Ерев.: 329. — *Centaurea balsamita* Lam. 1785, Encycl. Méth. Bot. 1: 667. — *Stizolophus balsamitaefolius* Cass. 1827, Dict. Sci. Nat. 51: 50, nom. illeg.

Описан по садовому экземпляру, выращенному из семян, собранных в «Леванте». Турус: «Dans le Levant, A. Michaux» (P-LAM!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. (вост. Турция, Ливан, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

2 (1013). *S. coronopifolius* (Lam.) Cass. 1827, Dict. Sci. Nat. 51: 51. — *Centaurea coronopifolia* Lam. 1785, Encycl. Méth. Bot. 1: 667. — *C. balsamitella* Bornm. 1928, Feddes Repert. 24: 374.

Описан, по-видимому, из Грузии. Турус: «Jacea orientalis annua, coronopifolio, flore luteo, Turnefort» (P!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек.; **ЮЗ3:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев. (Зовашен), Дар. (Гетап, Ехегнадзор).

Юго-Зап. Азия (центр. и сев.-вост. Турция, сев.-зап. Иран).

98 (208). *Hyalea* (DC.) Jaub. et Spach*

1 (1014). *H. pulchella* (Ledeb.) C. Koch, 1851, Linnaea, 24: 418. — *Centaurea pulchella* Ledeb. 1829, Icon. Pl. Fl. Ross. 1: 22. — *C. viminea* Less. 1831, Linnaea, 6: 83. — *Eremopappus pulchellus* (Ledeb.) Takht. 1945, Докл. АН АрмССР, 2, 1: 26.

Описан из Восточного Казахстана. Турус: «In subsalsis arenosis deserti Songoro — Khirgisici, Ledebour» (LE!, cum isotypo!).

ЮЗ3: Месх., Араг. (окр. Гюмри); **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах.; **Т.**

Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр. Азия.

99 (209). *Rhaponticoides* L. Vaill.**

1 (1015). *R. ruthenica* (Lam.) M. V. Agab. et Greuter, 2003, Willdenowia, 33: 61. — *Centaurea ruthenica* Lam. 1785, Encycl. Méth. Bot. 1: 663. — *C. schwarzenbergiana* Schur, 1855, Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturw. 6: 4.

Описан из Восточной Европы по культивированным образцам («dans la Russie, la Moscovie»). Lectotypus (Aghababyan, hoc loco): «De Moscovie, № 3, M. Demidow» (P!).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг.

* Э. Ц. Габриелян.

** М. В. Агаджян.