

обнаружен в Армении на интереснейшем во флористическом отношении Урцском хребте, где произрастают три небольшие популяции этого вида (около 50 растений в каждой). По всей вероятности, ущелье, в устье которого находятся эти популяции, является своеобразным рефугиумом для целого ряда очень редких исчезающих видов, имеющих дизъюнктивный ареал и занесенных в Красную книгу Армении.

### 97 (207). *Stizolophus* Cass.\*

1 (1012). *S. balsamita* (Lam.) Cass. ex Takht. 1946, в Тахт. и Фёд. Фл. Ерев.: 329. — *Centaurea balsamita* Lam. 1785, Encycl. Méth. Bot. 1: 667. — *Stizolophus balsamitaefolius* Cass. 1827, Dict. Sci. Nat. 51: 50, nom. illeg.

Описан по садовому экземпляру, выращенному из семян, собранных в «Леванте». Т у р u s: «Dans le Levant, A. Michaux» (P-LAM!).

**ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мерп.-Зан.

Юго-Зап. (вост. Турция, Ливан, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

2 (1013). *S. coronopifolius* (Lam.) Cass. 1827, Dict. Sci. Nat. 51: 51. — *Centaurea coronopifolia* Lam. 1785, Encycl. Méth. Bot. 1: 667. — *C. balsamitella* Bornm. 1928, Feddes Repert. 24: 374.

Описан, по-видимому, из Грузии. Т у р u s: «Jacea orientalis annua, coronopifolio, flore luteo, Turnefort» (P!).

**ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев. (Зовашен), Дар. (Гетап, Ехегнадзор).

Юго-Зап. Азия (центр. и сев.-вост. Турция, сев.-зап. Иран).

### 98 (208). *Hyalea* (DC.) Jaub. et Spach\*

1 (1014). *H. pulchella* (Ledeb.) C. Koch, 1851, Linnaea, 24: 418. — *Centaurea pulchella* Ledeb. 1829, Icon. Pl. Fl. Ross. 1: 22. — *C. viminea* Less. 1831, Linnaea, 6: 83. — *Eremorappus pulchellus* (Ledeb.) Takht. 1945, Докл. АН АрмССР, 2, 1: 26.

Описан из Восточного Казахстана. Т у р u s: «In subsalsis arenosis deserti Songoro — Khirgisici, Ledebour» (LE!, cum isotypo!).

**ЮЗЗ:** Месх., Араг. (окр. Гюмри); **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах.; **Т:**

Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр. Азия.

### 99 (209). *Rhaponticoides* L. Vaill.\*\*

1 (1015). *R. ruthenica* (Lam.) M. V. Agab. et Greuter, 2003, Willdenowia, 33: 61. — *Centaurea ruthenica* Lam. 1785, Encycl. Méth. Bot. 1: 663. — *C. schwarzenbergiana* Schur, 1855, Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturw. 6: 4.

Описан из Восточной Европы по культивированным образцам («dans la Russie, la Moscovie»). Л е к т о т y п u s (Aghababyan, hoc loco): «De Moscovie, № 3, M. Demidow» (P!).

**ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг.

\* Э. Ц. Габриэлян.

\*\* М. В. Агабабян.

Указан для **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 231).

Центр. (юго-вост.), Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (юг Зап. Сибири), Юго-Зап. (зап. Иран, сев.-вост. Афганистан, Пакистан), Ср., Центр. (сев.-зап. Китай, Монголия) Азия.

2 (1016). **R. tamanianiae** (M. V. Agab.) M. V. Agab. et Greuter, 2003, Willdenowia, 33: 61. — *Centaurea tamanianiae* M. V. Agab. 1989, Биол. журн. Арм. 42, 3: 186.

Описан из Армении. Т у р у s: «Ахурянский р-н, с. Крашен, гора Марал, правый борт ущелья Махари-дзор, 1800 м, горная степь, 27 VII 1987, К. Таманян, Г. Файвуш, М. Агабабян» (ERE, № 134045!; isotypus — ERE, № 150333!; LE!).

**ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Дар.

Эндемик.

3 (1017). **R. hajastana** (Tzvel.) M. V. Agab. et Greuter, 2003, Willdenowia, 33: 60. — *Centaurea hajastana* Tzvel. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 411. — *C. ruthe-nica* auct. non Lam.: Bordz. 1931, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 5: 67.

Описан из Армении. Т у р у s: «Джаджур, 23 VII 1931, Н. Кецховели и Т. Прокофьева» (ERE, № 40533!).

**ЮЗЗ**: Араг. (Ширак)

Эндемик.

Сближается с такими ксероморфными представителями рода как *R. lachnopus* Rech. f. (центр. Иран), *R. schmidii* Wagenitz (вост. Иран), *R. gontsharovii* Цjin, *R. androssovii* Цjin (Ср. Азия), отличающимися крупными сплюснутыми корзинками, широкими разорванными по краю пленчатými придатками листочков обертки и очень крупными (46–50 мм) краевыми цветками, с лопастями 3 мм шир.

4 (1018). **R. razdorskyi** (Karjagin) M. V. Agab. et Greuter, 2005, Willdenowia, 35: 237. — *Centaurea razdorskyi* Karjagin, 1963, Фл. СССР, 28: 607, 386; Карягин, 1961, Фл. Азерб. 8: 4 64, descr. ross.

Описан из Азербайджана. Т у р у s: «Азерб. ССР, район г. Сумгаит, к юго-западу от станции Наносная, на склонах горы Аг-Бурун, 14 VII 1952, И. Карягин» (ERE, № 78357!; isotypus — ВАК?). S y n t у р u s: «Азерб. ССР, район г. Сумгаит, к юго-зап. от станции Наносная, на склоне горы Аг-Буруна, 12 VI 1952, И. Карягин» (ERE, № 78369!).

**ВЗ**: Ширв.

Эндемик.

## 100 (210). *Centaurea* L. nom. cons.\*

### Subgen. 1. *Cyanus* (Mill.) Spach

#### Sect. 1. *Protocyanus* Dobroc.

##### Subsect. 1. *Montanae* (Hayek) Stef. et Georgiadou (incl. *Stricticaules* Czer.)

1 (1019). **C. nigrofimbria** (C. Koch) Sosn. 1926, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 2: 77. — *C. montana* L. var. *nigrofimbria* C. Koch, 1851, Linnaea, 24: 426.

---

\* Э. Ц. Габриэлян (Закавказье, Малый Кавказ) (Габриэлян, 1995), А. Д. Михеев (Предкавказье, Большой Кавказ) (Михеев, 1999, 2000).