

Указан для ЗК: Уруп-Тоб., В.Куб. (Танфильев, Кононов, 1987 : 9); ЮЗ: Ю. Караб. (Аскеров, 1977а : 1026 sub *W. pulchella*).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Ordo 6. Blechnales

Fam. 14. Blechnaceae (C. Presl) Copel.*

1.(33). Blechnum L.

1.(83). **B. spicant** (L.) Roth, 1794, Ann. Bot. (Usteri) 10 : 56. — *Osmunda spicant* L. 1753, Sp. Pl. : 1066.

Описан из Европы.

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Адж.

Указан для ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Тоб. (Косенко, 1970 : 19; Галушко, 1978 : 37); ЗЗ: Инг.-Рион., Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1928 : 13, 1949 : 31; Долуханов, 1964 : 46; Долуханов, Микеладзе, 1971 : 94–95).

Атл., Сев., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Вост. Азия; Сев. Америка.

Subclassis Marsileidae

Ordo 7. Marsiliales

Fam. 15. Marsileaceae Mirb.*

1.(34). Marsilea L.

1.(84). **M. quadrifolia** L. 1753, Sp. Pl. : 1099.

Описан из Франции.

ВП: Тер.-Сулак.; ЦК: В. Тер.; ЗЗ: Адж.; ВЗ: Ширв.; Т.

Указан для ЗП: Аз.-Куб. (Косенко, 1970 : 21; Галушко, 1978 : 39); ВП: В. Ставро., Тер.-Кум. (Галушко, 1978 : 39); ВЗ: Н. Кур. (Карягин, 1950б : 42–43; Аскеров, 1977а : 1029).

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Иран), Южн., Юго-Вост. Азия; Африка; Сев. Америка; Австралия.

2.(85). **M. strigosa** Willd. 1810, Sp. Pl. 5, 1 : 539.

Описан с юга России («Prope Sareptam»).

Указан для Т. (Гроссгейм, 1928 : 18, 1939 : 374, 1949 : 33; Фомин, 1934 : 91; Карягин, 1950б : 43; Аскеров, 1977а : 1029, 1983а : 839).

Вост. Европа; Средиз.; Ср. Азия.

* Г. Л. Кудряшова (Кудряшова, 2000)