

## ORDO 2. TRILLIALES

### Fam. 155. Trilliaceae Chevall.\*

#### 1. (3). Paris L.

1. (3). *P. quadrifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 367.

Описан из Европы.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Инг.-Рион. (пер. Бечо), Адж. (Бешуми); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак. (Галушко, 1978: 170).

Европа; Средиз.; Сев. Азия.

2. (4). *P. incompleta* Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 306; R. R. Mill, 1984, Fl. Turk. 8: 355.

Описан из Грузии: «... in Iberiae». Lectotypus (Mordak, hoc loco): «Ex Caucaso iberico. Com. Adam, a. 1805» (LE!).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш., В. Куб. (Галушко, 1978: 170); **ВК:** Кубин. (окр. с. Аных, Прилипка, 1952: 203).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

## ORDO 3. COLCHICALES

### Fam. 156. Colchicaceae DC.\*\*

#### 1. (4). Merendera Ramond

1. (5). *M. sobolifera* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1.: 34; C. D. Brickell, 1984, Fl. Turk. 8: 352; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 34. — *Colchicum soboliferum* (Fisch. et C. A. Mey.) Stef. 1926, Colchicum: 44; K. M. Perss. 1992, in Rech. f. Fl. Iran. 170: 20.

Описан из Северного Ирана: «... in prov. Aderbeidschan Persiae borealis». Typus: «Persia in pratis humidis circa Khoi. Prov. Aderbeidschan. 10 Juni 1828. Szovits 424» (LE! isotypi 4 LE!, G!, K!, H).

**ЮЗ:** Ерев. (Арабат, Мармарашен, Ереван).

Указан для **ВЗ:** Ширв. (пер. Чилинк) (Гроссгейм, 1940: 92, карта № 110; Исаев, 1952: 117).

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. (зап. Сирия, Турция, Иран, Афганистан), Ср. (Таджикистан: зап. Памироалай) Азия.

2. (6). *M. raddeana* Regel, 1881, Acta Horti Petropol. 7, 2: 544; id. 1881, Gartenflora 30: 293; Misch. 1912, Mat. Фл. Кавк. 2, 4: 94; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 34. — *Colchicum raddeanum* (Regel) K. M. Perss. 1992, in Rech. f. Fl. Iran. 170: 22. — *Merendera trigyna* auct. non (Stev. ex Adams) Stapf: C. D. Brickell, 1984, Fl. Turk. 8: 353, p. p.

Описан по растениям, присланным Г. И. Радде, по-видимому, из Ирана и культивируемым в Ботаническом саду Санкт-Петербурга, ошибочно указанным с Кавказа:

\*Е. В. Мордак, К. Г. Таманян

\*\*Э. Ц. Габриэлян, Е. В. Мордак

«Radde bulbos misit ex provinciis caucasicis». Тур у s: «Ex Caucaso misit Radde. [18] 81. 3. Ex horto bot. Petropolitana» (LE!). По свидетельству Г. И. Радде (Miscz. 1912: 95) вид был собран на горе Савалан в Персии, сохранились гербарные сборы: «Persia. Mons Sawalan. 20 VI 80. G. Radde 146» (3LE!, TGM!) (Wendelbo, 1979, in sched. LE, «lectotypus» и «syntypis»; Габриэлян, 2001: 34), принадлежащие *M. raddeana*.

**ВК:** Кубин. (г. Шахдаг); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг; **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Гроссгейм, 1940: 92, карта 110).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев. Иран).

3. (7). *M. manissadjianii* Aznav. 1908, Bull. Herb. Boiss. Ser. 2. 8, 4: 248; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 37. — *M. trigyna* auct. non (Stev. ex Adams) Stapf: C. D. Brickell, 1984, Fl. Turk. 8: 353, p. p.

Описан из Северной Турции: «Au mont Tavchan-dagh, près de Merzifoun Anatolie septentrionale». Тур у s: «Collines de Taoshandagh [Tavšan Dagh] pres Merzifoun, 1000–1400 m. 8 May, 1907. J. J. Manissadjian» (G! isotypi LE!, ? E).

**ЮЗЗ:** Араг; **ЮЗ:** Ерев., Занг.

Юго-Зап. Азия (Турция: Амасия).

4. (8). *M. trigyna* (Stev. ex Adams) Stapf, 1885, Denkschr. Acad. Wiss. (Math.-Naturw. Wien) 50: 18; C. D. Brickell, 1984, Fl. Turk. 8: 353, p. p.; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 38. — *Bulbocodium trigynum* Stev. ex Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 49. — *Merendera trigyna* (Stev. ex Adams) Stapf var. *ketzkhovellii* Kuth. 1949, в Сосн. Тр. Бот. сада АН АрмССР, 2: 5. — *Colchicum trigynum* (Stev. ex Adams) Stearn, 1934, Journ. Bot. (London) 72: 344; К. М. Perss. 1992, in Rech. f. Fl. Iran. 170: 16, p. p.

Описан с Кавказа: «Circa Tiflisium et ad lineam Caucasicam». Lectotypus (Gabrielian, Mordak, hoc loco): «Ex Caucaso» (LE!). Syntypus (Wendelbo, 1979, in sched. LE): «*Bulbocodium trigynum* m. [Adams]» (LE!).

**ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Н. Кур., Ширв.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Невинномысск); **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 25); **ВП:** (Галушко, 1978: 149); **ВЗ:** Иорск.-Шек., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб. (Исаев, 1952: 117).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

5. (9). *M. mirzoevae* Gabrielian, 1986, Биол. журн. Армении 39, 7: 582; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 38.

Описан из Армении. Тур у s: «Armenia, distr. Idzhevan, in viciniis p. Gandzakar [Verin Aghdan], in xerothamnio ca. 1000 m. s. m. 2. 3. 1984. A. Marutjan» (№ 143550 ERE!, isotypus LE!).

**ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг; **ЮЗ:** Севан.

Эндемик.

6. (10). *M. candidissima* Miscz. ex Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 190; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 41.

Описан из Тальша. Турус: «Prov. Vaku, distr. Lenkoran, prope pag. Orant, culta in sect. cauc. 3. 4. 1928, A. Grossheim» (ТВИ!).

**ЮЗ:** Севан. (Артаниш), Дар., Занг., Мегр.-Зан. (Мегри); **Т:** Эндемик.

7. (11). **M. greuteri** Gabrielian, 1999, Фл., растит., раст. рес. Армении 12: 15; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 41.

Описан из Армении. Турус: «Armenia, Shirak distr. In vicinitate pag. Areg, m. Arteni in steppis tragacanthaceis, 1500–1700 m. s. m. 9. 4. 1998. E. Gabrielian». (№146518 ERE!, isotypi: №146519 B!, №146520 LE!).

**ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг. (Шираки: г. Артени, между сс. Талин и Катнахбюр, с. Иринд).  
Эндемик.

8. (12). **M. eichleri** (Regel) Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 168. — *Bulbocodium eichleri* Regel, 1878, Acta Horti Petropol. 5, 2: 638; id. 1878, Gartenflora, 27: 294. — *Colchicum eichleri* (Regel) K. M. Perss. 1992, in Rech. f. Fl. Iran. 170: 18. — *Merendera trigyna* auct. non (Stev. ex Adams) Stapf: C. D. Brickell, 1984, Fl. Turk. 8: 353, p. p.

Описан с Восточного Кавказа по растениям, культивируемым в Ботаническом саду Санкт-Петербурга: «In Caucaso orientali prope Vaku, legit cl. Eichler». Lectotypus (Gabrielian, Mordak, hoc loco): [Is.] «Regel, 1878, Gartenflora 27: 294, tab. 952». Culta.

**ВП:** Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Ю. Караб.

Указан для: **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр. (Иванов, 2001: 33); **ВК:** Кубин. (Гроссгейм, 1940: 93, карта 113; Исаев, 1952: 118).

Эндемик.

9. (13). **M. ghalghana** Otsch. 1963, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 23: 65.

Описан с Северного Кавказа. Турус: «Caucasus septentr. Fauc. fl. Assa. In pratis regionis alpinae jugi Zey-lam. 11 V 1959. fl. Leg. D. Otschiauri, K. Kimeridze» (TGM!).

**ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.

Указан для **ВК:** В. Сулак (юг) (Галушко, 1978: 149).

Эндемик.

## 2. (5). *Colchicum* L.

1. (14). **C. speciosum** Stev. 1829, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 1: 165 (? 1824, fide Stafleu, Cowan, 1985, Tax. Lit., ed. 2, 5: 914); C. D. Brickell, 1984, Fl. Turk. 8: 347; K. M. Perss. 1992, in Rech. f. Fl. Iran. 170: 33; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 45. — *C. lenkoranicum* (Misch.) Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 191.

Описан по растениям, полученным из Грузии от Х. Вильгельмса и выращенным в Никитском ботаническом саду Крыма: «Ex Iberia bulbos misit Dr. Wilhelms». Турус: «Ex Iberia. Н [ort.] Nik [ita]. Comm. Steven a. 1822» (Н, photo LE!, isotypi — LE!, MW)

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ВК:** Кубин.; **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Указан для **ЦК:** Малк., В. Тер. (Галушко, 1978: 151).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев. Иран).