

прикрепления вегетативных луковичек и разными типами фактуры их поверхности (крупночешуйчатой, пемзовидной, почти гладкой), поскольку луковички легко утрачиваются при гербаризации. Эту группу видов необходимо дополнительно изучить в природной обстановке, а при гербаризации обязательно фиксировать цвет околоцветника и особенно луковичек. Самым распространенным видом в этом регионе является *G. turanica*, к которому относится позднее описанный из Юго-Западного Закавказья Р. Аскеровой *G. gadzhievii*, holotypus: «Transcaucasia, Nachrespublica, Ordubad, in montibus Chaschly-dagh, in calcareis, 9 V 1933, T. Heideman et Prilipko», ВАК, photo — LE! Изначально *G. turanica* обнаружен в статусе гибрида (Левичев, 1990). Однако новые материалы свидетельствуют, что это таксон видового ранга, вероятно, гибридный по происхождению.

Ser. 3. Persicae Levichev

36. (58). *G. gageoides* (Zucc.) Vved. 1932, Фл. Туркм. 1, 2: 261. — *Bulbillaria gageoides* Zucc. 1843, Abh. Akad. Wiss. Bayer. 3: 229. — *Gagea persica* Boiss. 1846, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 7: 108.

Описан из Ливана. Typus: «Libanon, in subalpinis umbrosis, Majus 1838, Roth et Erdl» (M).

ЮЗ: Нах.

Указан для ЮЗ: Ерев. (Таманян, 2001: 106).

Юго-Зап., Ср. Азия.

Для *G. persica* выбран lectotypus (Левичев, 2006: 948): «prope ruinas u. Persepolis, 15 Apr. 1842, 237a, sub nom. *G. ambliopetala* var. *bulbifera*, Th. Kotschy» (LE! isolectotypi plur.).

2. (7). *Lloydia* Reichenb.*

1. (59). *L. serotina* (L.) Reichenb. 1830, Fl. Germ. Excurs.: 102; Rech. f. 1990, Fl. Iran. 165: 57. — *Anthericum serotinum* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 444.

Описан по материалам из Англии и Швейцарии.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; ЦК: Малк., В. Тер.; ВК: Ассо-Арг., В. Сулак.; ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Алаз.-Агрнич. (Тианети).

Атл., Сев., Центр., Южн., Вост., Юго-Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

3. (8). *Lilium* L.**

Sect. *Martagon* Duby

Subsect. 1. *Martagon*

1. (60). *L. martagon* L. 1753, Sp. Pl.: 303.

Описан из Европы (Венгрии, Швейцарии) и Сибири.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Сев. (Зап. и Вост. Сибирь), Юго-Зап. (Турция), Центр. (Монголия) Азия.

На Кавказе только один подвид.

L. martagon subsp. *caucasicum* Misch. ex Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 218; Г. Кудр. 1971, Новости сист. высш. раст. 8: 98. — *L. caucasicum* (Misch. ex Grossh.) Grossh. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 142; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 618; Манден. 1941,

*Е. В. Мордак

**Г. Л. Кудряшова (Кудряшова, 1971)