

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх.

Эндемик.

В. И. Липский подробно описал историю находки и опубликования этого вида (Липский, 1894а, б, Lipsky, 1894). Он обнаружил этот своеобразный вид в окр. Сухуми в 1891 г. в плодах, сразу определил его как новый род для флоры Кавказа — *Dioscorea* sp., но для точного определения вида посадил корневища в Киеве (где впоследствии и получил цветущие мужские и женские побеги), а также собрал в Абхазии дополнительные гербарные образцы. Кроме того, он обратил внимание на это растение Н. М. Альбова, который собрал его в различных районах Абхазии — по ущельям рек Гумисты, Маджарки, в окр. Цебельды и др. Подготавливая подробную публикацию с описанием всех особенностей морфологии мужских и женских экземпляров, он заказал таблицы Покровскому, что задержало опубликование вида (Липский, 1894а). Альбов, имея большой материал по этому виду, подготовил описание и обратился с письмом к Липскому в конце 1892 г. с вопросом о его намерениях публикации нового вида: «Как Вы предполагаете поступить с найденной в Абхазии Диоскореей, т. е. намерены ли Вы описать ее сами или думаете предоставить ее описание мне. Прошу Вас известить меня об этом заблаговременно — дабы не появилось в литературе 2 названия одного и того же растения». Липский ответил отрицательно, но вскоре получил от Альбова «брошюрку („дозволено цензурою 19 января 1893 г.“) с описанием *D. caucasica* Lipsky, in litteris», чем был возмущен (Липский, 1894б).

Позднее описание этого вида было опубликовано в Женеве (Albow, 1893) с фамилиями двух авторов («Lipsky et Albow»). Таким образом, Альбов указал авторство названия вида Липского, но опередил его при опубликовании.

В ботанической литературе (Knuth, 1930) цитировалось на первом месте более позднее описание, данное Липским в 1894 г. (не 1893 г., как цитировано), а на втором — данное в 1893 г. (январь) в статье Альбова, что противоречит правилу приоритета. В последние годы морфология, ареал и экология вида изучены И. Л. Крыловой (1996).

2. (14). *Tamus* L.

1. (90). *T. communis* L. 1753, Sp. Pl.: 1028; Цветкова, 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 291.

Описан из Южной Европы: «In Europae australis».

ЗП: З. Ставр.; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; ЮЗЗ: Араг. (Шираки); ЮЗ: Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; Т.

Атл., Центр. (редко), Юго-Вост. (включая Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран, Ирак) Азия.

Экземпляры с тычиночными цветками иногда ошибочно определяются как *Habitzia tamnoides* (и наоборот), а в Западном Закавказье выходящие стебли *Tamus communis* изредка растут, перевивая лианы мужских особей *Dioscorea caucasica*, что также может приводить к ошибкам при определении.

Superordo Orchidanae

ORDO 7. ORCHIDALES

Fam. 160. Orchidaceae Juss.*

Subfam. 1. Neottioideae Lindl.

1. (15). *Epipactis* Zinn

1. (91). *E. veratrifolia* Boiss. et Hohen. 1854, in Boiss. Diagn. Pl. Or. Nov. Ser. 1, 13: 11.

Описан из Ирана. *Typus*: «... in faucibus March Mahal montis Elburs prope Derbend, Kotschy 27. Jun. 1843. N 401. 632» (holotypus — G, isotypus — LE!).

*Л. В. Аверьянов (Аверьянов, 1994а; Averyanov, 1994б)