

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх.

Эндемик.

В. И. Липский подробно описал историю находки и опубликования этого вида (Липский, 1894а, б, Lipsky, 1894). Он обнаружил этот своеобразный вид в окр. Сухуми в 1891 г. в плодах, сразу определил его как новый род для флоры Кавказа — *Dioscorea* sp., но для точного определения вида посадил корневища в Киеве (где впоследствии и получил цветущие мужские и женские побеги), а также собрал в Абхазии дополнительные гербарные образцы. Кроме того, он обратил внимание на это растение Н. М. Альбова, который собрал его в различных районах Абхазии — по ущельям рек Гумисты, Маджарки, в окр. Цебельды и др. Подготавливая подробную публикацию с описанием всех особенностей морфологии мужских и женских экземпляров, он заказал таблицы Покровскому, что задержало опубликование вида (Липский, 1894а). Альбов, имея большой материал по этому виду, подготовил описание и обратился с письмом к Липскому в конце 1892 г. с вопросом о его намерениях публикации нового вида: «Как Вы предполагаете поступить с найденной в Абхазии Диоскореей, т. е. намерены ли Вы описать ее сами или думаете предоставить ее описание мне. Прошу Вас известить меня об этом заблаговременно — дабы не появилось в литературе 2 названия одного и того же растения». Липский ответил отрицательно, но вскоре получил от Альбова «брошюрку („дозволено цензурою 19 января 1893 г.“) с описанием *D. caucasica* Lipsky, in litteris», чем был возмущен (Липский, 1894б).

Позднее описание этого вида было опубликовано в Женеве (Albow, 1893) с фамилиями двух авторов («Lipsky et Albow»). Таким образом, Альбов указал авторство названия вида Липского, но опередил его при опубликовании.

В ботанической литературе (Knuth, 1930) цитировалось на первом месте более позднее описание, данное Липским в 1894 г. (не 1893 г., как цитировано), а на втором — данное в 1893 г. (январь) в статье Альбова, что противоречит правилу приоритета. В последние годы морфология, ареал и экология вида изучены И. Л. Крыловой (1996).

2. (14). *Tamus* L.

1. (90). *T. communis* L. 1753, Sp. Pl.: 1028; Цветкова, 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 291.

Описан из Южной Европы: «In Europae australis».

ЗП: З. Ставр.; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; ЮЗЗ: Араг. (Шираки); ЮЗ: Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; Т.

Атл., Центр. (редко), Юго-Вост. (включая Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран, Ирак) Азия.

Экземпляры с тычиночными цветками иногда ошибочно определяются как *Habitzia tamnoides* (и наоборот), а в Западном Закавказье выходящие стебли *Tamus communis* изредка растут, перевивая лианы мужских особей *Dioscorea caucasica*, что также может приводить к ошибкам при определении.

Superordo Orchidanae

ORDO 7. ORCHIDALES

Fam. 160. Orchidaceae Juss.*

Subfam. 1. Neottioideae Lindl.

1. (15). *Epipactis* Zinn

1. (91). *E. veratrifolia* Boiss. et Hohen. 1854, in Boiss. Diagn. Pl. Or. Nov. Ser. 1, 13: 11.

Описан из Ирана. *Typus*: «... in faucibus March Mahal montis Elburs prope Derbend, Kotschy 27. Jun. 1843. N 401. 632» (holotypus — G, isotypus — LE!).

*Л. В. Аверьянов (Аверьянов, 1994а; Averyanov, 1994б)

ЮЗ: Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап., Вост. Азия; Центр. Африка.

2. (92). **E. helleborine** (L.) Crantz, 1769, Stirp. Austr. ed. 2, 2: 467. — *Serapias helleborine* L. 1753, Sp. Pl.: 949, p. p. quoad var. *latifolia* L. — *S. latifolia* (L.) L. 1767, Syst. Nat. ed. 12, 2: 593. — *Epipactis latifolia* (L.) All. 1785, Auct. Fl. Pedem. 2: 151, nom. rej.

Описан из Европы. Lectotypus (Vermeulen, 1955: 239): «Haller, 1768, Hist. Stirp. Helv. 2: T. 40».

ЗП; ЗК; ЦК; ВК: Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан., Занг.; Т.

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ВК:** В. Сулак.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Караб. (Гроссгейм, 1940: 252, 253; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 552; Ахундов и др., 1952: 264, 265; Львов, 1960: 352; Галушко, 1978: 180; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. (Казахстан), Центр. (сев.-зап. Китай, сев.-зап. Монголия) Азия; Сев. Америка.

3. (93). **E. atrorubens** (Hoffm. ex Bernh.) Bess. 1809, Prim. Fl. Galic. 2: 220. — *Serapias grex atrorubens* Hoffm. 1804, Deutschl. Fl. ed. 2, 4: 182, stat. indef. — *Epipactis helleborine* var. *rubiginosa* Crantz, 1769, Stirp. Austr. ed. 2, 2: 467. — *E. atropurpurea* Raf. 1810, Caratt.: 87. — *E. rubiginosa* (Crantz) Gaud. ex C. Koch, 1844, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 2: 801.

Описан из Германии. Lectotypus (Baumann et al., 2002: 157): Gunners, 1772, Fl. Norw., 2, T. V, 3–6.

ЗП: 3. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; Т.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1940: 253; Галушко, 1978: 180; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Европа; Сев. Азия (зап. Сибирь).

4. (94). **E. persica** (Soó) Nannf. 1946, Bot. Not. (Lund), 1946: 11, 21. — *Helleborine persica* Soó, 1927, Feddes Repert. 24: 36.

Описан из Ирана. Syntypus: «Persia: Sultanabad (Strauss); Elburs pr. Derbent (Kotschy [1843], N 921)». Lectotypus: [Iran] «Sultanabad, in prov. Hamadan, Strauss» («holotypus», JE) (fide Renz, Taubenheim, 1984: 466).

Указан для **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Занг. (Торосян, 1986а: 684).

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Сирия, сев. Ирак, сев. Иран, Афганистан, зап. Пакистан).

5. (95). **E. microphylla** (Ehrh.) Sw. 1800, Kungl. Sv. Vet.-Acad. Handl. n. ser. 21: 232. — *Serapias microphylla* Ehrh. 1791, Beitr. Naturk. 4: 42.

Описан из Германии: «Habitat in sylvis montanis Electoratus Brunsvico-Luneburgici». Lectotypus (Renz, Taubenheim, 1984: 468): «...in monte Deister, Ehrhard» (W).

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; Т.

Указан для **ВЗ**: Алаз.-Агрнич.; **ЮЗ**: Занг. (Гроссгейм, 1940: 253; Ахундов и др., 1952: 265; Торосян, 1986б: 607).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Европа; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Иран) Азия.

6. (96). **E. palustris** (L.) Crantz, 1769, Stirp. Austr. ed. 2, 2: 462. — *Serapias helleborine* var. *palustris* L. 1753, Sp. Pl. 2: 950. — *S. palustris* (L.) Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, N 3.

Описан из Европы. Lectotypus (Baumann et al., 1989: 474): Morison, 1699, Pl. Hist. Univ. 3: 487, sect. 12, T. 11, f. 7.

ЗП; **ВП**; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**: Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ**: Месх.

Указан для **ЗК**: В. Куб.; **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Гроссгейм, 1940: 253; Галушко, 1978: 180; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Атл., Сев., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (Сибирь), Юго-Зап. (сев. Ирак, сев. Иран), Ср. (сев.-вост. Казахстан), Центр. (сев. Китай, зап. Монголия) Азия.

2. (16). *Cephalanthera* Rich.

1. (97). **C. kurdica** Bornm. ex Kraenzl. 1895, Bull. Herb. Boiss. 3: 143. — *C. floribunda* Woronow, 1908, Вестн. Тифл. бот. сада, 10: 22. — *C. epipactoides* auct. non Fisch. et Mey.: Невский, 1935, Фл. СССР, 4: 631; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 249; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 646.

Описан из Ирака. Typus: «Kurdistania: (Assyria orient.) In montis Kuh Setin reh. infer. ad pagum Schaklava (ditiones Erbil.), 1100 — 1200 m, 27. 05. 1893, Bornmueller, N 1833» (holotypus — В, isotypus — JE, LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЮЗ**: Мегр.-Зан. Указан для **ВЗ**: Караб.; **ЮЗ**: Занг. (Ахундов и др., 1952: 261; Торосян, 1986а: 683, 684).

Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Ирак, зап. Иран) Азия.

2. (98). **C. rubra** (L.) Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot.: 38. — *Serapias rubra* L. 1767, Syst. ed. 12, 2: 594.

Описан из Европы. Lectotypus: «Hb. Burser, 10: 45» (UPS).

ЗП; **ЗК**; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**; **ЮЗЗ**: Месх.; **ЮЗ**: Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; Т.

Указан для **ВП**: В. Ставр.; **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: В. Сулак.; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Севан. (Гроссгейм, 1940: 250; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 553, 554; Сахокия, Хуцишвили, 1975: 166; Галушко, 1978: 178; Торосян, 1986б: 608; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Иран) Азия.

3. (99). **C. damasonium** (Mill.) Druce, 1906, Ann. Scott. Nat. Hist. 60: 225. — *Serapias damasonium* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, N 2. — *S. grandiflora* L. 1767, Systema, ed. 12, 2: 594, nom. illeg. superfl. — *Epipactis alba* Crantz, 1769, Stirp. Austr. ed. 2, 2: 460. — *Serapias lonchophyllum* L. f. 1781, Suppl.: 405. — *S. pallens* Jundz. 1791, Fl. Lithuan.: 268, nom. invalid. — *Cephalanthera pallens* (Jundz.) Rich. 1817, Orchid.