

Указан для **ЗК**: Адаг-Пишиш.; **ЦК**: В. Кум.; **ВК**: В. Сулак.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Адж.; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1940: 256; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 557, 558; Дмитриева, 1959: 362; Галушко, 1978: 178).

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция, сев. и сев.-зап. Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

### 7. (21). *Spiranthes* Rich.

1. (107). *S. spiralis* (L.) Chevall. 1827, Fl. Gen. Env. Paris, 2: 330. — *Ophrys spiralis* L. 1753, Sp. Pl.: 945. — *O. autumnalis* Balb. 1801, Elenco: 96. — *Spiranthes autumnalis* (Balb.) Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot.: 37.

Описан по материалам из Италии, Франции и Англии. Lectotypus: «Нб. Linn. 1056/8» (BM).

**ЗЗ; Т.**

Атл., Центр., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Сирия, Турция, сев. Иран) Азия.

### Subfam. 2. Orchidoideae

### 8. (22). *Herminium* Guett.

1. (108). *H. monorchis* (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. (см. f.) Hort. Kew, ed. 2, 5: 191. — *Ophrys monorchis* L. 1753, Sp. Pl.: 947.

Описан из Европы. Lectotypus: «Нб. Linn. 1056/22» (BM).

**ЦК; ВК; ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗК**: Уруп-Тоб., В. Куб. (Гроссгейм, 1940: 246; Галушко, 1978: 180; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия.

### 9. (23). *Coeloglossum* C. Hartm.

1. (109). *C. viride* (L.) C. Hartm. 1820, Handb. Scand. Fl.: 329. — *Satyrium viride* L. 1753, Sp. Pl.: 944.

Описан из Европы. Lectotypus: «Нб. Linn. 1055/3» (BM).

**ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ**: Ерев., Севан., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП**: З. Ставр.; **ВП**: В. Ставр.; **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1940: 247; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 559).

Европа; Азия (холодные и умеренные области, а также горные районы субтропической зоны); Сев. Америка.

### 10. (24). *Platanthera* Rich.

1. (110). *P. bifolia* (L.) Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot.: 35. — *Orchis bifolia* L. 1753, Sp. Pl. 2: 939.

Описан из Европы. Lectotypus: «Нб. Linn. 1054/15» (BM).

**ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК; ВК; ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; **Т.**

Указан для **ЗП**: Аз-Куб.; **ЗК**: Адаг-Пишиш.; **СЗЗ**: Анап.-Гел. (Гроссгейм, 1940: 248; Галушко, 1978: 181).

Европа; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Иран), Сев., Центр. Азия.

Из Закавказья описан подвид *Platanthera bifolia* subsp. *atropatanica* В. Baumann, Н. Baumann, Lorenz et Peter, 2003, J. Eur. Orch. 35, 1: 184; т y п u c: «Aserbajdschan, Lenkoran — Lerik, Talysch, 360 m, TC 89.84, 25.5.1997, leg. В. et Н. Baumann» (STU). Растения подвида характеризуются большей высотой, крупными листьями, более мелкими цветками.

2. (111). **P. chlorantha** (Custer) Reichenb. 1829, in Moessler, Handb. Gewachsk. ed. 2: 1565. — *Orchis chlorantha* Custer, 1827, in Steinmueller, Neue Alp. 2: 401.

Описан из Швейцарии.

**ЗП; ВП:** В. Ставр.; **ЗК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Ширв., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Ю. Караб.

Указан для **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Мерг.-Зан.; **Т** (Гроссгейм, 1940: 249; Ахундов и др., 1952: 260; Торосян, 1986б: 609).

Европа; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Ирак, сев. Иран) Азия.

## 11. (25). *Gymnadenia* R. Br.

1. (112). **G. conopsea** (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. f. Hort. Kew, ed. 2, 5: 191. — *Orchis conopsea* L. 1753, Sp. Pl.: 942.

Описан из Европы. Лектотипус: «Нб. Linn. 1054/40» (BM).

**ЗП; ВП:** В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Европа; Азия (умеренные области, а также горные районы субтропической зоны).

Для флоры Кавказа иногда указывается кроме типового подвида также *G. conopsea* subsp. *densiflora* (Wahl.) A. Camus, 1908, Monogr. Orch. Eur.: 327. — *Orchis densiflora* Wahl. 1806, Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. 27: 68 (Смолянинова, 1976: 35). На наш взгляд, этот трудно различимый в гербарном состоянии таксон распространен преимущественно в Центральной и Восточной Европе и на Кавказе не встречается. В альпийском и субальпийском поясах гор *G. conopsea* практически на всем протяжении своего ареала представлен миниатюрными формами с короткоцилиндрическими или почти головчатыми соцветиями и более яркими цветками. Для таких растений предложены названия: *G. conopsea* var. *alpina* Turcz. ex Reichenb. f. 1851, Ic. Fl. Germ. 13–14: 115, tab. 73, 1,3; *G. conopsea* subsp. *alpina* (Turcz. ex Reichenb. f.) Janch. ex Soó, 1969, Ann. Univ. Budapest. (Biol.), 11: 60; *G. alpina* (Turcz. ex Reichenb. f.) Czer. 1981, Сосуд. раст. СССР: 310. Отличия этих форм от типового подвида обусловлены, по-видимому, чисто модификационной изменчивостью, ввиду чего мы не придаем им особого таксономического ранга.

## 12. (26). *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski

1. (113). **D. incarnata** (L.) Soó, 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3. — *Orchis incarnata* L. 1755, Fl. Suec. ed. 2: 312.

Описан из Швеции. Лектотипус: «Нб. Linn. 1054/33» (BM).

**ЗП:** З. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.

Указан для **ЗП:** Аз-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (Гроссгейм, 1940: 242; Галушко, 1978: 183; Танфильев, Кононов, 1987: 30).

Европа; Сев. (Зап. Сибирь, юг Вост. Сибири), Вост. (Монголия, Китай) Азия.

Изолированные популяции *Dactylorhiza incarnata* с территории Азербайджана рассматриваются в качестве самостоятельного подвида *D. incarnata* subsp. *baumgartneriana* В. Baumann, Н. Baumann, Lorenz et Peter (Baumann et al., 2003: 165), экземпляры которого отличаются от представителей типового подвида меньшей высотой, более широкими листьями, более короткими листочками околоцветника. Т y п u c: «Aserbajdschan, Sheki, Kondelen, nasse Wiege, Kleinseggenried, Grossegegnried, 360 m, PL 76.18.38, 25.04.2000, leg. В. et Н. Baumann, R. Lorenz et R. Peter» (STU).