

## 17. (30). *Himantoglossum* W. D. J. Koch

1. (142). *H. caprinum* (Bieb.) C. Koch, 1849, *Linnaea*, 22: 287. — *Orchis caprina* Bieb. 1819, *Fl. Taur.-Cauc.* 3: 602.

Описан из Крыма: «... in Tauriae pratis sylvaticis». *Тур у s*: «Tauria. 1818, Bieb.» (LE!).

**СЗЗ**: Анап.-Гел.

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Нам известен только один гербарный экземпляр (с сомнительной этикеткой) этого вида с территории Кавказа, но нахождение таксона в указанном районе подтверждалось рядом авторов (Котов, Протопопова, 1960: 77–82; Косенко, 1970: 543; Литвинская, 1982: 45; 1988: 64–68; Литвинская и др., 1983: 148; Зернов, 2002: 91). К настоящему времени этот редкий вид в естественных местообитаниях на Кавказе, возможно, не сохранился (Литвинская, 1987: 136–143; 1988: 64–68).

2. (143). *H. formosum* (Stev.) C. Koch, 1849, *Linnaea*, 22: 287. — *Orchis formosa* Stev. 1813, *Mem. Soc. Nat. Moscou*, 4: 106. — *O. mutabilis* Stev. 1815, *Trans. Linn. Soc. London (Bot.)*, 11: 417, tab. 39; id. 1812, *Mem. Soc. Nat. Moscou*, 3: 244, nom. nud. [*Тур у s*: «Kubam. Steven» (LE!)]. — *Aceras formosa* (Stev.) Lindl. 1835, *Gen. Sp. Orchid.*: 282.

Описан из Вост. Кавказа: «In silvis Caucasi orientalis inter Derbentum et Kubam...». *Лectotypus*: «... in silvis umbrosis circa Kubam Caucasi orientalis. Steven» (H, *islectotypus* — LE!).

**ВК**: Кубин.; **ВЗ**: Н. Кур.; **Т**.

Указан для **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур.; **ВЗ**: Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1940: 246; Ахундов и др., 1952: 255; Львов, 1960: 350; Галушко, 1978: 181).

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран).

## 18. (31). *Serapias* L.

1. (144). *S. vomeracea* (Burm. f.) Briq. 1910, *Prodr. Fl. Corse*, 1: 378. — *Orchis vomeracea* Burm. f. 1770, *Nova Acta Acad. Leop.-Carol.* 4, App.: 237.

Описан с о. Корсика без точного указания местонахождения. *Тур у s*: (G?).

**ЗЗ**.

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Сирия).

## 19. (32). *Ophrys* L.

1. (145). *O. caucasica* Woronow ex Grossh. 1928, *Фл. Кавк.* 1: 261.

Описан по материалам с Кавказа: «Дагестан, Абхазия, Грузия, Азербайджан». *Лectotypus*: (Averyanov, 1994: 123): Абхазия, «In pratis prope Jurjewskoje (Tzebel-da), 19 IV — 2 V 1902. Leg. G. Woronow. № 196» (LE!).

1а. *O. caucasica* Woronow ex Grossh. subsp. *caucasica*.

**СЗЗ**; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ**: Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1940: 31; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 577, 578; Галушко, 1978: 186).

Эндемик.