

Указан для **ВЗ**: Алаз.-Агрнич.; **ЮЗ**: Занг. (Гроссгейм, 1940: 253; Ахундов и др., 1952: 265; Торосян, 1986б: 607).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Европа; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Иран) Азия.

6. (96). **E. palustris** (L.) Crantz, 1769, Stirp. Austr. ed. 2, 2: 462. — *Serapias helleborine* var. *palustris* L. 1753, Sp. Pl. 2: 950. — *S. palustris* (L.) Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, N 3.

Описан из Европы. Lectotypus (Baumann et al., 1989: 474): Morison, 1699, Pl. Hist. Univ. 3: 487, sect. 12, T. 11, f. 7.

ЗП; **ВП**; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**: Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ**: Месх.

Указан для **ЗК**: В. Куб.; **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Гроссгейм, 1940: 253; Галушко, 1978: 180; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Атл., Сев., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (Сибирь), Юго-Зап. (сев. Ирак, сев. Иран), Ср. (сев.-вост. Казахстан), Центр. (сев. Китай, зап. Монголия) Азия.

2. (16). *Cephalanthera* Rich.

1. (97). **C. kurdica** Bornm. ex Kraenzl. 1895, Bull. Herb. Boiss. 3: 143. — *C. floribunda* Woronow, 1908, Вестн. Тифл. бот. сада, 10: 22. — *C. epipactoides* auct. non Fisch. et Mey.: Невский, 1935, Фл. СССР, 4: 631; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 249; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 646.

Описан из Ирака. Typus: «Kurdistania: (Assyria orient.) In montis Kuh Setin reh. infer. ad pagum Schaklava (ditiones Erbil.), 1100 — 1200 m, 27. 05. 1893, Bornmueller, N 1833» (holotypus — В, isotypus — JE, LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЮЗ**: Мегр.-Зан. Указан для **ВЗ**: Караб.; **ЮЗ**: Занг. (Ахундов и др., 1952: 261; Торосян, 1986а: 683, 684).

Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Ирак, зап. Иран) Азия.

2. (98). **C. rubra** (L.) Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot.: 38. — *Serapias rubra* L. 1767, Syst. ed. 12, 2: 594.

Описан из Европы. Lectotypus: «Hb. Burser, 10: 45» (UPS).

ЗП; **ЗК**; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**; **ЮЗЗ**: Месх.; **ЮЗ**: Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ВП**: В. Ставр.; **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: В. Сулак.; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Севан. (Гроссгейм, 1940: 250; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 553, 554; Сахокия, Хуцишвили, 1975: 166; Галушко, 1978: 178; Торосян, 1986б: 608; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Иран) Азия.

3. (99). **C. damasonium** (Mill.) Druce, 1906, Ann. Scott. Nat. Hist. 60: 225. — *Serapias damasonium* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, N 2. — *S. grandiflora* L. 1767, Systema, ed. 12, 2: 594, nom. illeg. superfl. — *Epipactis alba* Crantz, 1769, Stirp. Austr. ed. 2, 2: 460. — *Serapias lonchophyllum* L. f. 1781, Suppl.: 405. — *S. pallens* Jundz. 1791, Fl. Lithuan.: 268, nom. invalid. — *Cephalanthera pallens* (Jundz.) Rich. 1817, Orchid.

Eur. Annot.: 38. — *C. grandiflora* (L.) S.F. Gray, 1821, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 210; Bab. 1843, Man. Brit. Bot.: 296. — *C. alba* (Crantz) Simonk. 1886, Enum. Fl. Transs.: 504. — *C. lonchophyllum* (L. f.) Reichenb. ff. 1851, Icon. Fl. Germ. 13–14, tab. 119 (sub tab.): 136 (in syn.) — *C. lonchophyllum* (L. f.) Mansf. 1938, Feddes Repert. 43: 238, comb. superfl.

Описан из Англии. Турус (BM?).

ЗП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Занг., Ю. Караб.

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1940: 252; Галушко, 1978: 178; Торосян, 1986б: 607, 608; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Европа; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Иран) Азия.

4. (100). *C. longifolia* (L.) Fritsch, 1888, Österr. Bot. Zeitschr. 38: 81. — *Serapias helleborine* var. *longifolia* L. 1753, Sp. Pl. 2: 950. — *S. lonchophyllum* L. f. 1781, Suppl.: 404. — *Cephalanthera ensifolia* Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot.: 38. — *C. xiphophyllum* (L. f.) Reichenb. f. 1851, Icon. Fl. Germ. 13–14: 135.

Описан из Европы. Lectotypus: «Hb. Linn. 1057/4» (BM).

ЗП: Аз-Куб.; **ЗК; ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; Т.

Указан для **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Ширв. (Гроссгейм, 1940: 250; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 554; Львов, 1960: 352; Галушко, 1978: 179).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

5. (101). *C. caucasica* Kraenzl. 1931, Feddes Repert. (Beih.), 65: 67. — *C. acuminata* Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 78, non Lindl. 1840.

Описан из Закавказья. Турус: «In silvis montis Talusch. pr. pagum Swant. Henacker, N 2740» (holotypus — LE!, isotypus — LE!).

ВЗ: Ширв.; **ЮЗ:** Занг., Ю. Караб.; Т.

Указан для **ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гроссгейм, 1940: 250, 252; Ахундов и др., 1952: 262).

Эндемик.

Гибрид *Cephalanthera longifolia* × *C. caucasica*, обнаруженный в окр. пос. Шемаха, описан под названием *Cephalanthera* × *renzii* В. Baumann, H. Baumann, Lorenz et Peter, 2003, J. Eur. Orch. 35, 1: 185. Турус: «Sis N Samaxi, 1300–1400 m, silva humida, TF 91. 69., 31.05.1997, leg. В. & H. Baumann» (STU).

3. (17). *Limodorum* Boehm.

1. (102). *L. abortivum* (L.) Sw. 1799, Nova Acta Soc. Sci. Upsal. 6: 80. — *Orchis abortiva* L. 1753, Sp. Pl.: 943. — *Centrosis abortiva* (L.) Sw. 1814, Summa Veg. Scand.: 32.

Описан по материалам из Франции, Швейцарии, Англии и Италии: «Habitat in Gallia, Helvetia, Anglia, Italia». Lectotypus: «Hb. Linn. 1054/43» (BM).