

Eur. Annot.: 38. — *C. grandiflora* (L.) S.F. Gray, 1821, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 210; Bab. 1843, Man. Brit. Bot.: 296. — *C. alba* (Crantz) Simonk. 1886, Enum. Fl. Transs.: 504. — *C. lonchophyllum* (L. f.) Reichenb. ff. 1851, Icon. Fl. Germ. 13–14, tab. 119 (sub tab.): 136 (in syn.) — *C. lonchophyllum* (L. f.) Mansf. 1938, Feddes Repert. 43: 238, comb. superfl.

Описан из Англии. Турус (BM?).

ЗП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Занг., Ю. Караб.

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1940: 252; Галушко, 1978: 178; Торосян, 1986б: 607, 608; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Европа; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Иран) Азия.

4. (100). *C. longifolia* (L.) Fritsch, 1888, Österr. Bot. Zeitschr. 38: 81. — *Serapias helleborine* var. *longifolia* L. 1753, Sp. Pl. 2: 950. — *S. lonchophyllum* L. f. 1781, Suppl.: 404. — *Cephalanthera ensifolia* Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot.: 38. — *C. xiphophyllum* (L. f.) Reichenb. f. 1851, Icon. Fl. Germ. 13–14: 135.

Описан из Европы. Lectotypus: «Hb. Linn. 1057/4» (BM).

ЗП: Аз-Куб.; **ЗК; ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; Т.

Указан для **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Ширв. (Гроссгейм, 1940: 250; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 554; Львов, 1960: 352; Галушко, 1978: 179).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

5. (101). *C. caucasica* Kraenzl. 1931, Feddes Repert. (Beih.), 65: 67. — *C. acuminata* Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 78, non Lindl. 1840.

Описан из Закавказья. Турус: «In silvis montis Talusch. pr. pagum Swant. Henacker, N 2740» (holotypus — LE!, isotypus — LE!).

ВЗ: Ширв.; **ЮЗ:** Занг., Ю. Караб.; Т.

Указан для **ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гроссгейм, 1940: 250, 252; Ахундов и др., 1952: 262).

Эндемик.

Гибрид *Cephalanthera longifolia* × *C. caucasica*, обнаруженный в окр. пос. Шемаха, описан под названием *Cephalanthera* × *renzii* В. Baumann, H. Baumann, Lorenz et Peter, 2003, J. Eur. Orch. 35, 1: 185. Турус: «Sis N Samaxi, 1300–1400 m, silva humida, TF 91. 69., 31.05.1997, leg. В. & H. Baumann» (STU).

3. (17). *Limodorum* Boehm.

1. (102). *L. abortivum* (L.) Sw. 1799, Nova Acta Soc. Sci. Upsal. 6: 80. — *Orchis abortiva* L. 1753, Sp. Pl.: 943. — *Centrosis abortiva* (L.) Sw. 1814, Summa Veg. Scand.: 32.

Описан по материалам из Франции, Швейцарии, Англии и Италии: «Habitat in Gallia, Helvetia, Anglia, Italia». Lectotypus: «Hb. Linn. 1054/43» (BM).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Гроссгейм, 1940: 254; Ахундов и др., 1952: 266, 267; Галушко, 1978: 180; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Ирак, сев. и зап. Иран) Азия.

4. (18). *Listera* R. Br.

1. (103). *L. ovata* (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. (f.) Hort. Kew ed. 2, 5: 202. — *Ophrys ovata* L. 1753, Sp. Pl. 2: 946.

Описан из Европы. Тур us: «Нб. Linn. 1056/10» (ВМ).

ЗП; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗК:** В. Куб.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх. (Гроссгейм, 1940: 255; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 549, 550; Ахундов и др. 1952: 268, 269; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Вост. Азия; Сев. Америка.

2. (104). *L. cordata* (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. (f.) Hort. Kew, ed. 2, 5: 201. — *Ophrys cordata* L. 1753, Sp. Pl. 2: 946.

Описан из Северной Европы. Тур us: «Нб. Linn. 1056/11» (ВМ).

ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция) и Вост. Азия; Сев. Америка.

5. (19). *Neottia* Guett.

1. (105). *N. nidus-avis* (L.) Rich. 1817, Orch. Eur. Annot.: 37. — *Ophrys nidus-avis* L. 1753, Sp. Pl.: 945.

Описан по материалам из Швеции, Германии и Франции. Lectotypus: «Нб. Linn. 1056/1-3» (ВМ).

ЗП; **ЗК;** **ЦК:** В. Тер.; **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Занг. (Гроссгейм, 1940: 256; Ахундов и др., 1952: 269; Галушко, 1978: 178; Торосян, 1986: 608; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Европа; Средиз.; Сев. и Юго-Зап. Азия (Турция, сев. и зап. Иран).

6. (20). *Goodyera* R. Br.

1. (106). *G. repens* (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. f. Hort. Kew, ed. 2, 5: 198. — *Satyrrium repens* L. 1753, Sp. Pl.: 945.

Описан по материалам из Швеции, Англии, Сибири и Швейцарии. Lectotypus: «Нб. Linn. 1055/7» (ВМ).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп.-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.