

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Гроссгейм, 1940: 254; Ахундов и др., 1952: 266, 267; Галушко, 1978: 180; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Ирак, сев. и зап. Иран) Азия.

4. (18). *Listera* R. Br.

1. (103). *L. ovata* (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. (f.) Hort. Kew ed. 2, 5: 202. — *Ophrys ovata* L. 1753, Sp. Pl. 2: 946.

Описан из Европы. Тур us: «Нб. Linn. 1056/10» (ВМ).

ЗП; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗК:** В. Куб.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх. (Гроссгейм, 1940: 255; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 549, 550; Ахундов и др. 1952: 268, 269; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Вост. Азия; Сев. Америка.

2. (104). *L. cordata* (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. (f.) Hort. Kew, ed. 2, 5: 201. — *Ophrys cordata* L. 1753, Sp. Pl. 2: 946.

Описан из Северной Европы. Тур us: «Нб. Linn. 1056/11» (ВМ).

ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция) и Вост. Азия; Сев. Америка.

5. (19). *Neottia* Guett.

1. (105). *N. nidus-avis* (L.) Rich. 1817, Orch. Eur. Annot.: 37. — *Ophrys nidus-avis* L. 1753, Sp. Pl.: 945.

Описан по материалам из Швеции, Германии и Франции. Lectotypus: «Нб. Linn. 1056/1-3» (ВМ).

ЗП; **ЗК;** **ЦК:** В. Тер.; **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Занг. (Гроссгейм, 1940: 256; Ахундов и др., 1952: 269; Галушко, 1978: 178; Торосян, 1986: 608; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Европа; Средиз.; Сев. и Юго-Зап. Азия (Турция, сев. и зап. Иран).

6. (20). *Goodyera* R. Br.

1. (106). *G. repens* (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. f. Hort. Kew, ed. 2, 5: 198. — *Satyrrium repens* L. 1753, Sp. Pl.: 945.

Описан по материалам из Швеции, Англии, Сибири и Швейцарии. Lectotypus: «Нб. Linn. 1055/7» (ВМ).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп.-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.