

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Гроссгейм, 1940: 254; Ахундов и др., 1952: 266, 267; Галушко, 1978: 180; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Ирак, сев. и зап. Иран) Азия.

4. (18). *Listera* R. Br.

1. (103). *L. ovata* (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. (f.) Hort. Kew ed. 2, 5: 202. — *Ophrys ovata* L. 1753, Sp. Pl. 2: 946.

Описан из Европы. Тур us: «Нб. Linn. 1056/10» (ВМ).

ЗП; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗК:** В. Куб.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх. (Гроссгейм, 1940: 255; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 549, 550; Ахундов и др. 1952: 268, 269; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Вост. Азия; Сев. Америка.

2. (104). *L. cordata* (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. (f.) Hort. Kew, ed. 2, 5: 201. — *Ophrys cordata* L. 1753, Sp. Pl. 2: 946.

Описан из Северной Европы. Тур us: «Нб. Linn. 1056/11» (ВМ).

ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция) и Вост. Азия; Сев. Америка.

5. (19). *Neottia* Guett.

1. (105). *N. nidus-avis* (L.) Rich. 1817, Orch. Eur. Annot.: 37. — *Ophrys nidus-avis* L. 1753, Sp. Pl.: 945.

Описан по материалам из Швеции, Германии и Франции. Lectotypus: «Нб. Linn. 1056/1-3» (ВМ).

ЗП; **ЗК;** **ЦК:** В. Тер.; **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Занг. (Гроссгейм, 1940: 256; Ахундов и др., 1952: 269; Галушко, 1978: 178; Торосян, 1986: 608; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Европа; Средиз.; Сев. и Юго-Зап. Азия (Турция, сев. и зап. Иран).

6. (20). *Goodyera* R. Br.

1. (106). *G. repens* (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. f. Hort. Kew, ed. 2, 5: 198. — *Satyrrium repens* L. 1753, Sp. Pl.: 945.

Описан по материалам из Швеции, Англии, Сибири и Швейцарии. Lectotypus: «Нб. Linn. 1055/7» (ВМ).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп.-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.

Указан для **ЗК**: Адаг-Пишиш.; **ЦК**: В. Кум.; **ВК**: В. Сулак.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Адж.; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1940: 256; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 557, 558; Дмитриева, 1959: 362; Галушко, 1978: 178).

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция, сев. и сев.-зап. Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

7. (21). *Spiranthes* Rich.

1. (107). *S. spiralis* (L.) Chevall. 1827, Fl. Gen. Env. Paris, 2: 330. — *Ophrys spiralis* L. 1753, Sp. Pl.: 945. — *O. autumnalis* Balb. 1801, Elenco: 96. — *Spiranthes autumnalis* (Balb.) Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot.: 37.

Описан по материалам из Италии, Франции и Англии. Lectotypus: «Нб. Linn. 1056/8» (BM).

ЗЗ; Т.

Атл., Центр., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Сирия, Турция, сев. Иран) Азия.

Subfam. 2. Orchidoideae

8. (22). *Herminium* Guett.

1. (108). *H. monorchis* (L.) R. Br. 1813, in Ait. et Ait. (см. f.) Hort. Kew, ed. 2, 5: 191. — *Ophrys monorchis* L. 1753, Sp. Pl.: 947.

Описан из Европы. Lectotypus: «Нб. Linn. 1056/22» (BM).

ЦК; ВК; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗК**: Уруп-Тоб., В. Куб. (Гроссгейм, 1940: 246; Галушко, 1978: 180; Танфильев, Кононов, 1987: 29).

Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия.

9. (23). *Coeloglossum* C. Hartm.

1. (109). *C. viride* (L.) C. Hartm. 1820, Handb. Scand. Fl.: 329. — *Satyrium viride* L. 1753, Sp. Pl.: 944.

Описан из Европы. Lectotypus: «Нб. Linn. 1055/3» (BM).

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ**: Ерев., Севан., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП**: З. Ставр.; **ВП**: В. Ставр.; **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1940: 247; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 559).

Европа; Азия (холодные и умеренные области, а также горные районы субтропической зоны); Сев. Америка.

10. (24). *Platanthera* Rich.

1. (110). *P. bifolia* (L.) Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot.: 35. — *Orchis bifolia* L. 1753, Sp. Pl. 2: 939.

Описан из Европы. Lectotypus: «Нб. Linn. 1054/15» (BM).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК; ВК; ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; **Т.**

Указан для **ЗП**: Аз-Куб.; **ЗК**: Адаг-Пишиш.; **СЗЗ**: Анап.-Гел. (Гроссгейм, 1940: 248; Галушко, 1978: 181).

Европа; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, сев. Иран), Сев., Центр. Азия.