

## ORDO 8. IRIDALES

### Fam. 161. Iridaceae Juss.\*

#### 1. (35). *Crocus* L.

1. (151). *C. scharojanii* Rupr. 1868, in Gartenflora, 5, 17: 134.

Описан с Западного Кавказа: «... in Lande der Abadsechen, im Quellen gebiete der Bjelaja, in der Nähe des hohen Berges Oschten, in einer Höhe von beinahe 1100 Toisen». Lectotypus (Михеев, 2004: 1178): «Cauc. bor.-occ. Abadsechia ... montem Oschten ad fontes fl. Bjelaja. П. Шароян. В верховьях р. Белой. Август 1865 (около 7000')» (LE!).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Туап.-Адлер., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.  
Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

2. (152). *C. vallicola* Herb. 1845, Edwards's Bot. Reg. 31, Misc.: 2.

Описан из северо-восточной Турции. Syn typi: «... in convalle monticulosa alpium Trapezunticarum ad pedes vallis orientalis summae in monte Koulak Dagħ dicto, ad hospitio primo in cacumine plus horae unius itineris spatio a pago Stauros dicto accidenti, X 1843, Kotschy; ibid., X 1844, Cartwright».

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Туап.-Адлер., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.  
Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

3. (153). *C. x suworowianus* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 633. — *C. kotschianus* C. Koch subsp. *suworowianus* (C. Koch) V. Mathew, 1980, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 38: 393. 4. — *C. karsianus* Fomin, 1909, Фомин и Воронов, Определ. раст. Кавк. и Крыма, 1: 292; V. Mathew, 1980, l. c.: 393.

Описан из Грузии: «... von Fürst Konstantin Suworoff erhielt ich dieselbe Art aus Letschkum». Turus: «... aus Letschkum. [Konstantin Suworoff]» (В ?, LE ?).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ЦЗ:** Инг.-Рион., Карт.-Ю. Ос.; **ЗЗ:** Туап.-Адлер., Абх.

Юго-Зап. Азия (сев. и центр. Турция).

Данный таксон, очевидно, представляет собой гибридное образование между *C. vallicola* и *C. scharojanii*, так как обладает промежуточными признаками между ними, приближаясь то к одному, то к другому, и встречается практически везде, где эти два вида обитают совместно. Такое же мнение у В. С. Ябровой (1947) и Н. И. Шориной (1979). *C. x suworowianus* в ранге подвида должен приводиться как типовой, т. е. *C. suworowianus* C. Koch subsp. *suworowianus*, а не *C. kotschianus* subsp. *suworowianus*, как у Mathew, (1980, l. c.), поскольку *C. suworowianus* C. Koch был описан раньше (1848), чем *C. kotschianus* C. Koch (1853). *C. karsianus* Fomin на территории Кавказа никем не обнаружен до сих пор и никем не указывается, несмотря на предположение Гроссгейма (1940: 202) о его возможном нахождении в приграничных с Турцией районах. V. Mathew (l. c., 1980: 393) принимает его за синоним *C. suworowianus*.

4. (154). *C. autranii* Albov, 1893, Bull. Herb. Boiss. 1, 5: 242.

Описан из Абхазии: «Hab. in pratis alpinis montium calcaeorum Abchasiae (mons Czipshira, alt. 7000 ped.». Fl. Septembro. Lectotypus (Mikheev, 2004: 1178): «Бзыбский хребет, уроч. Хоу близ Чипшира, 2000 м, № 552. 2 окт. N. Alboff» (iso. — LE!).

\* А. Д. Михеев (Михеев, 2003, 2004б,в)

33: Абх.

Эндемик.

Неясный вид: кроме типовых образцов, хранящихся в G и LE, отсутствует какой либо другой материал. В гербарии сходен с *C. speciosus*. Возможно, *C. autranii* — какая-нибудь аберрантная форма *C. speciosus*.

5. (155). *C. reticulatus* Stev. ex Adams, 1805, in Weber et Mohr, Beitrage zur Naturkunde, 1: 45; B. Mathew, 1982, The Crocus: 72, quoad subsp. reticulatus.; — *C. variegatus* Hoppe et Hornsch. 1818, Tagebuch: 187.

Описан с Кавказа: «Floret prime ad lineam Caucasicam». Lectotypus (Михеев, 2004: 1178): «... ad lineam Caucasicam. Steven» (LE!).

ЗП; ВП: В. Ставр.; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; ЦК; ВК: Ассо-Арг.; СЗЗ: Анап.-Гел., Пшад.-Джубг.; ЗЗ: Абх.

Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. Азия (центр., южн. Турция).

6. (156). *C. adamii* J. Gay, 1831, Bull. Sci. Nat. Geol. 25: 319. — *C. biflorus* Mill. var. *adamii* (J. Gay) Trautv. 1859, Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. 17: 330. — *C. biflorus* Mill. subsp. *adamii* (J. Gay) B. Mathew, 1982, The Crocus: 83. — *C. biflorus* auct. non Mill.: Wendelbo et B. Mathew, 1975, in Rech. f. Fl. Iran., 112: 5, p. p. — *C. geghartii* Sosn. 1949, Тр. бот. сада АН Арм. ССР, 2: 8.

Описан из Крыма и Грузии: «... in Tauria et Iberia». Syntypus — LE! К.

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; ЗЗ: Рион.-Квир.; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агрнич., Ширв., Йорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Юго-Вост. Европа (Югославия, Болгария, европ. Турция, Крым); Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

По свидетельству Э. Ц. Габриэлян (2001: 115), А. А. Ахвердовым и Н. В. Мирзоевой в Армении собраны образцы этого вида, цветущие осенью.

7. (157). *C. tauricus* (Trautv.) Puring, 1900, Acta Horti Bot. Univ. Jurjev. 1: 194. — *C. biflorus* Mill. var. *tauricus* Trautv. 1859, Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. 17: 331. — *C. vernus* auct. non (L.) Hill: Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 28.

Описан из Крыма: «... in der Krym beobachtet vorden ist».

СЗЗ: Анап.-Гел.

Юго-Вост. Европа (Крым).

8. (158). *C. artvinensis* (G. Philippow) Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 248. — *C. biflorus* var. *artvinensis* G. Philippow, 1917, Бот. каб. и бот. сад Никит. Бот. сада, 5: 26. — *C. biflorus* Mill. subsp. *artvinensis* (G. Philippow) Mathew, 1982, The Crocus: 84.

Описан из сев.-вост. Турции: «... supra Lomaschen, distr. Artvin, prope Batum. 11.1.[19]10, Andronaki» (Holotypus — ТВИ?).

ЗЗ: ?Адж. (гора Хино-Сарбиела). По мнению А. А. Дмитриевой (1980: 155), образец, собранный ею в Аджарии, не может быть достоверно определен.

Указан для: ЮЗ: Нах. (Гроссгейм, 1940: 204; Рзазаде, 1952: 212).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

9. (159). *C. caspius* Fisch. et C. A. Mey. in Hohen. 1838, Bull. Soc. Nat. Mosc. 11: 252.

Описан из Талыша: «Crescit in pratis prope pagum Sialakenti in vicinitate castelli Lenkoran et prope pagum Astara». Lectotypus (Михеев, 2004: 1179): «In pratis prope

pagum Sialakenti in vicinitate castelli Lenkoran et prope ruinas urb. Astara. Oct. Hohenacker» (LE!).

Т (Ленкорань, Астара).

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран).

10. (160). *C. speciosus* Bieb. 1798, Tabl. prov. Casp. Terek, Kour. Appendix: 111; id. 1808. Fl. Taur.-Cauc. 1: 27; В. Mathew, 1982, The Crocus: 111, quoad. subsp. *speciosus*.

Описан с Восточного Кавказа. Турус: «... copiosissimus in collibus, agris, pascuis» [in prov. Casp. Terek, Kour]. Местонахождение типового материала неизвестно.

ЗП: З. Ставр.; ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; ЦК: В. Тер.; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; ЗЗ; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; ВЗ: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; ЮЗ: Ерев., Занг., Ю. Караб.; Т.

Указан для ЮЗЗ: Месх. (Шхиян, 1969: 327).

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран); Юго-Вост. Европа (Крым).

11. (161). *C. polyanthus* Grossh. 1936, Тр. Бот. ин-та Азерб. фил. АН СССР, 2: 251.

Описан из Азербайджана (Тальш). Турус: «Зувандский район (в горном Тальше), близ с. Космальян. А. Гроссгейм и Рза Рзаев» (? ВАК).

Т.

Эндемик.

## 2. (36). *Iris* L.

### 1. Subgen. *Scorpiris* Spach

1. (162). *I. caucasica* Stev., aggr.

1a. *I. caucasica* Stev. in Bieb. I, 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 33. — *I. caucasica* Hoffm. VI 1808, Comment. Soc. Phys.-Med. Univ. Mosq. 1, 1: 40. — *Juno caucasica* (Hoffm.) Tratt. 1821, Auswahl. Gartenpfl. 1: 136; Klatt, 1872, Bot. Zeit. 30: 498.

Описан из Грузии: «In collibus apricis circa Tiffin». Турус: «*Iris caucasica* Stev. Tiflis» (Herb. Hoffm. № 398, MW).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ: Араг.; ЮЗ: Сев., Занг., Ю. Караб., Нах.; Т.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, Иран, сев.-вост. Ирак).

По правилу приоритета Х. Стевен является автором названия вида, описание которого помещено в январе 1808 г. у М. Биберштейна (Bieberstein, 1808, 1: 33). В статье Г. Ф. Гофмана, напечатанной в цитированном сборнике, под заглавием указан 1806 год, который нельзя считать датой обнародования вида, так как сборник вышел в свет в июне 1808 г. Уточнение времени выхода в свет 1-го тома «Комментариев ...» дано в публикации Е. В. Мордак (2000: 20), что потребовало номенклатурных изменений.

1b. *I. schischkinii* Grossh. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 13: 3.

Описан из Шахбузского района Нахичеванской АССР. Турус: «Азербайджан, Нахичеванская АССР, Шахбузский район, близ болота Батабад, около 2100 м, на скалистых склонах. Собр. А. А. Гроссгейм, И. А. Ильинская, М. И. Кирпичников. 26.V.1947 г.» (holotypus, cum isotypis — LE!).