

31. (192). *I. helena* C. Koch, 1870, Wochenschr. Gärtn. Pflanzenk. 13: 179. — *Oncocyclycus helena* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 639, nom. inval., sine diagn. — *I. acutiloba* var. *lineolata* Trautv., 1871, Acta Horti Petrop. 1, 1: 24. — *I. lineolata* (Trautv.) Grossh. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 221. — *I. acutiloba* subsp. *lineolata* (Trautv.) Mathew, Wendelbo, 1975, in Rech. f. Fl. Iran., 112: 32. — *I. ewbankiana* Foster, 1901, Gard. Chron., Ser. 3, 29: 397.

Описан из Азербайджана: «In der schwäbischen Dorfes Helenendorf bei Elisabethopol». Местонахождение типа неизвестно.

**ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:** Юго-Зап. (Турция, Иран); Ср. (Туркмения) Азия.

32. (193). *I. schelkownikowii* (Fomin) Fomin, 1909, Фомин, Воронов, Определ. раст. Крыма и Кавк., 1: 299. — *I. acutiloba* var. *schelkownikowii* Fomin, 1904, Тр. Тифл. бот. сада, 6, 3: 44.

Описан из Азербайджана: «Habitat in collibus aridis Karadsha-dagh prope jugum Vos-dagh Transcaucasiae orientalis secum ripam sinistrum Cyri». Турус: «Возвышенность Караджа-даг (Ареш. у.). Собр. А. Шелковников. 27 III 1909». (Neotypus?: Notae criticae in sched. An. A. Fedorov, 1963: «E loco classico! Topotypus!») (holotypus — TBI?, isotypus — LE!).

**ВЗ:** Йорск.-Шек., Н. Кур.  
Эндемик.?

33. (194). *I. grossheimii* Woronow ex Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 255.

Описан из Южного Закавказья: «Нах. г. Союх». Lectotypus (Габриэлян, 2001: 133): «Prov. Nachitschevan, prope pag. Sojuch, culta in sect. cauc. 30 IV 1925. Leg. E. Koenig» (TBI).

**ЮЗ:** Мегр.-Зан., Нах.  
Эндемик.

### 3. (37). Род *Gladiolus* L.

1. (195). *G. italicus* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, №2; — *G. segetum* Ker.-Gawl. 1804, Curtis's Bot. Mag. 19, tab. 719; Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 139; Черняковская, 1935, Фл. СССР, 4: 580; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 226; Ахундов, 1952, Фл. Азерб. 2: 237; Шхиян, 1969, Определ. раст. Грузии, 2: 330; Wendelbo, Mathew, 1975, in Rech. f. Fl. Iran., 112:70. — *G. tenuiflorus* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 636; Черняковская, 1935, Фл. СССР, 4: 581.

Описан из Европы по культивированным образцам.

**ВК; ЦЗ:** Лори; **ВЗ; ЮЗ:** Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т:** Южн. Европа; Сев. Африка; Юго-Зап., Ср. (юг) Азия.

2. (196). *G. dzhavakheticus* Eristavi, 1977, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 34: 38.

Описан из Грузии. Турус: «Georgia, Dzavakhetia, in viciniis lacus Tabatzchuri, prope pag. Citeli-Sagdari, 20.7.1976. M. Eristavi» (TBI).

**ЮЗЗ:** Джав.-В. Ахур.

Указан для: **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ЮЗЗ:** Араг. (Габриэлян, Оганесян, 2001: 149).

Эндемик.

3. (197). *G. tenuis* Bieb. 1808, Fl. Taur-Cauc. 1: 29. — *G. imbricatus* auct. non L.: Bieb., 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 38; Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 141; Черняковская, 1935, Фл. СССР, 4: 537; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 226; Ахундов, 1952, Фл. Азерб. 2: 238; Эристави, 1974, Зам. сист. геогр. раст (Тбилиси), 31: 70. — *G. apterus* auct. non Klok.: Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 637.

Описан с Кавказа: «... in graminosis Caucasi subalpini». *Lectotypus* (Эристави, 1974: 70): «... circa Acidulam Narzana lectus [Bieb.]». Ex herbario Marschall Bieberstein (LE!).

**ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК.**

Указан для: **СЗЗ** (Зернов, 2002: 283); **ЗЗ:** Абх.; (Колаковский, 1986: 252); **ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ахур., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Сев., Дар. (Габриэлян, Оганесян, 2001: 153).

Вост. (южн. часть), Юго-Вост. (горн. Крым) Европа; Ср. Азия (Мугоджары).

4. (198). *G. caucasicus* Herb. 1842, Bot. Reg. 28, p. 65, misc. 82. — *G. communis* auct. non L.: Черняковская, 1935, Фл. СССР, 4: 582, p. p; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 226; Ахундов, 1952, Фл. Азерб. 2: 238; — Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 139, pro syn. *G. segetum* Ker.-Gawl.

Описан из Грузии: «Species perpulchra ex Tiflis vicinia». Тип в Лондоне (K).

**ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ахур., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.

Эндемик.

5. (199). *G. murgusicus* Mikheev, 2004, Новости сист. высш. раст. 36: 98–99.

Описан из Иджеванского района Армении. *Typus*: «Armenia. In pratis fruticosis in adjacentibus urb. Berd. 20 V 1989. A. Mikheev» (LE!).

**ВЗ:** Мург.-Муровд.

Эндемик.

6. (200). *G. kotschyanus* Boiss. 1854, Diagn. Pl. Or. ser. 1, 13: 15. — *G. imbricatus* L. var. *kotschyanus* (Boiss.) Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 141.

Описан из Турецкой Армении. *Lectotypus* (Габриэлян, Оганесян, 2001: 154; она же, 1997, in herb. G — BOIS): «... in Mesopotamia inter Suerek et Diarbekir, 1843, Kotschy 163» (G — BOIS, isolectotypus — K).

6а. *G. kotschyanus* Boiss. subsp. *kotschyanus*

**ЦЗ:** Лори, **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ахур., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг.

Указан для **ВК:** Кубин. (Ахундов, 1952: 238).

Юго-Зап. Азия (Турция, сев.-вост. Ирак, сев.-зап. Иран).

6б. *G. kotschyanus* Boiss. subsp. *distichus* Gabrielian, 2001, Восточная, 13: 451; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 154.

Описан из Южного Закавказья, басс. оз. Севан. *Typus*: «Armenia, Sevan distr. In vicinitate pag. Lchashen, in Bughda, altiherbetum subalpinum. 8. 8. 1967. E. Gabrielian» (ERE 145367, isotypi — ERE 115361–115362).

**ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг.

Эндемик.

7. (201). *G. hajastanicus* Gabrielian, 2001, Воссонеа, 13: 451; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 154.

Описан из Армении. Турус: «Armenia, Daralegiz, angustiae Alajasenses. In vicinitate р. Chermou (Kavushuk), inter saxa, 1800–2000 m s. m. 18.6.1957. E. Gabrielian (ERE 148410, isotypus — ERE 148411–148412).

Указан для ЮЗ: Ереван., Сев., Дар., Занг. (Габриэлян, Оганесян, 2001: 156).  
Эндемик.

8. (202). *G. menitskyi* Gabrielian, 2001, Воссонеа, 13: 454; Габриэлян, 2001, Фл. Арм., 10: 160.

Описан из Талыша. Турус: «Transcaucasus: distr. Lerikensis, vallis fluminis ad pagum Amburdare, pratum graminosum inundatum. 11.6.1979. T. Popova et Ju. Menitsky, № 11» (ERE 78679, isotypus — ERE 78680, isotypus — LE!).

Т.

Указан для ЮЗ: Дар. (Габриэлян, Оганесян, 2001: 161).  
Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

9. (203). *G. atrovioleaceus* Boiss. 1854, Diagn. Pl. Or. ser. 1, 13: 14. — *G. aleppicus* Boiss. 1854, Diagn. Pl. Or. ser.1, 13: 13. — *G. armeniacus* Hausskn. ex J. N. Gérard, 1892, Gard. et Forest, 5: 318. — *G. sintenisii* Baker, 1892, Handb. Irid.: 202.

Описан из Ирана. Сунтупи: «Inter segetes prope urbem Teheran, 17 apr. 1843. Th. Kotschy. Pl. Pers. № 28; in Persia circa Isphahan. Aucher-Eloy № 5352» (G — BOIS, K, LE!).

ЮЗЗ: Араг.; ЮЗ; Т.

Юго-Вост. Европа (Греция, европ. Турция); Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Израиль, Ирак, сев. Иран), Ср. (Туркм.) Азия.

10. (204). *G. szovitsii* Grossh. 1927, Beih. Bot. Centralbl. 44, 2: 206. — *G. halophilus* auct. non Boiss. et Heldr.: Черняковская, 1935, Фл. СССР, 4: 588; Гроссг., 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 227; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 637; Wendelbo, Mathew, 1975, in Rech. f. Fl. Iran. 112: 73; Эристави, 1983, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 39: 18. — *G. atrovioleaceus* auct. non Boiss.: Kit Tan et J. R. Edmondson, 1984, Fl. Turk. 8: 448.

Описан из Южного Закавказья. Турус: «Distr. Zangezur, supra pagum Megry in lapidosis. Fl. 30.5.1923. Leg. A. Grossheim» (holotypus — ВАК?, isotypus — LE!, ERE).

10а. *G. szovitsii* Grossh. subsp. *szovitsii*.

ЮЗ: Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран).

10б. *G. szovitsii* Grossh. subsp. *pseudopersicus* Ogan. et Gabrielian, 2001, Воссонеа, 13: 453; iid., Фл. Армении, 10: 160.

Описан из Армении. Турус: «Armenia, Meghry, distr. in faucis Shvanidzor. 29.7.1945. A. Akhverdov». (ERE 128741).

ЮЗ: Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).