

Fam. 164. **Asphodelaceae** Juss.*

1. (40). **Eremurus** Bieb.

Subgen. 1. **Eremurus**

Ser. 1. **Eremurus**

Ser. *Spectabiles* A. Khokhr. 1965

1. (207). **E. spectabilis** Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 269, nom. cons.; V. A. Matthews, 1984, Fl. Turk. 8: 87; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 386. — *E. caucasicus* Stev. 1832, Bull. Soc. Nat. Moscou, 4: 251. — *E. spectabilis* subsp. *spectabilis*, — Wendelbo, 1982, in Rech. f. Fl. Iran. 151: 14.

Описан по материалам с Северного Кавказа и Крыма: «...in campis elatis promontorii Caucasi septentrionalis inter fluvium Kuman et rivum Sablja, ad viam publicam. Eundem in Tauriae maxime meridionalis rupestribus reperit D. Steven». Турус: *Eremurus* [*Erymnurus*], err.] caucasicus. «In montibus haud procul Sabli promont. Caucasici ad viam publicam quae ... ad pagum Alexandria 1813» (Herb. Bieb. — LE!) тип. cons. 2005.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ВК:** Кубин. (Рзазаде, 1952: 123); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ахур. (Капеллер. 1941: 457).

Юго-Вост. (Крым) Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия.

Ф. Биберштейн (1819: 269) в протокол к *E. spectabilis* включил в качестве синонима раннее видовое название *Asphodelus altaicus* Pall., 1779. Таким образом, название *E. spectabilis* является незаконным, как излишнее название (nom. superfl.) и поэтому N. Turland (2000, Тахон, 49, 1: 97) предложил консервацию названия *E. spectabilis* с типом, процитированным выше. Это предложение было принято XVII Международным ботаническим конгрессом в 2005 г. в Вене.

2. (208). **E. tauricus** Stev. 1832, Bull. Soc. Nat. Moscou, 4: 253; Харкев. 1964, Бот. журн. 49, 2: 259.

Описан из Крыма: «Tauriae littoralis Nikitae».

СЗЗ: Анап.-Гел. (окр. Новороссийска).

Юго-Вост. Европа (Крым).

3. (209). **E. azerbaijdzhanicus** Charkev. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 45.

Описан по культивируемому образцу, происходящему из Азербайджана. Турус: «Выращен в Киеве, в Центральном республиканском ботаническом саду АН УССР из корневых систем, завезенных весной 1959 г. из Шекинского нагорья (окр. с. Халдан, Азербайджанской ССР). 26. 05. 1961. С. С. Харкевич». (LE!, isotypus — KW).

ВЗ: Иорск.-Шек.

Эндемик.

4. (210). **E. zangezuristicus** Mikheev, 1996, Бот. журн. 81, 5: 79; он же, 2004, Новости сист. высш. раст. 36: 104. — *E. spectabilis* auct. non Bieb.: Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 386, p. p.

*Е. В. Мордак, К. Г. Таманян

Описан по культивируемому образцу, происходящему из Армении. Turus: «Растение, выращенное из корневищ, собранных в Армении южнее г. Гориса на сухих травянистых с кустарниками крутых щебнистых склонах. 15. 07. 1994 г. А. Михеев». (LE!).

ЮЗ: Занг.

Эндемик.

2. (41). *Asphodelus* L.

1. (211). *A. fistulosus* L. 1753, Sp. Pl.: 309; V. A. Matthews, 1984, Fl. Turk. 8: 85; Аскерова, 1997, Бот. журн. 82, 3: 94.

Описан по материалам из Франции, Испании и Крита.

ВЗ: Ширв. (Апшерон). Заносный.

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (зап. и южн. Турция); Сев. Африка.

2. (212). *A. tenuifolius* Cav. 1801, Anal. Ciens. Nat. 3: 46; Wendelbo, 1982, in Rech. f. Fl. Iran. 151: 4; id. 1985, Fl. Iraq 8: 57; Аскерова, 1997, Бот. журн. 82, 3: 94.

Описан из Африки. Turus: «de Mogador en África, Broussonet». (МА).

Т («Ленкоранский р-н, терр. Института многолетних насаждений, на плантациях. 7 VIII 1945. Л. Прилипко». ВАК). Заносный.

Средиз.; Юго-Зап. Азия; Африка.

3. (42). *Asphodeline* Reichenb.

Sect. 1. *Asphodeline*

1. (213). *A. prolifera* (Bieb.) Kunth, 1843, Enum. Pl. 4: 563; Миц. 1912, Мат. Фл. Кавк. 2, 4: 124; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 20. — *Asphodelus prolifera* Bieb. I, 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 280. — *Anthericum dendroides* Hoffm. VI, 1808, Comment. Soc. Phys.-Med. Univ. Mosq. 1, 1: 43; Stev. 1812, Mem. Soc. Nat. Moscou, 3: 249, 261. — *Asphodeline dendroides* (Hoffm.) Woronow, 1914, Тр. Тифл. бот. сада, 12, 2: 28, Sched. Herb. Fl. Cauc. N 57; Черняк. 1935, Фл. СССР, 4: 32; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 97; Капеллер, 1941, Фл. Груз. 2: 455; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 608; Прил. 1952, Фл. Азерб. 2: 121; Wendelbo, 1982, in Rech. f. Fl. Iran. 151: 5; V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 96; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 380.

Описан из Армении (Ахтала): «... in Armeniae ibericae campis editis. Legi ad torrentem Debeda, prope metallifodinas Achtalenses». Lectotypus (Мордак, 2000: 20): «Ex Armenia iberica? a. 1802». (Herb. Bieb. — LE!).

ВК: Кубин.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Иорск.-Шек., Шир., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; ЮЗЗ: Араг.; ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; Т (Зуванд).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, зап. Иран).

2. (214). *A. lutea* (L.) Reichenb. 1830, Fl. Germ. Excurs.: 116; V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 89; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 383. — *Asphodelus luteus* L. 1753, Sp. Pl.: 309.

Описан из Сицилии.

ЗК: Адаг.-Пишиш.; ЦК: В. Кум., Малк.; СЗЗ: Анап.-Гел.; ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. (Они); ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Мург.-Муровд. (окр. Иджевана, редко).

Указан для **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб. (Галушко, 1978: 152); **ЗЗ**: Адж. (сел. Шуахеви) (Дмитриева, 1990: 139).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Палестина, Иордания).

3. (215). **A. tenuior** (Fisch. ex Bieb.) Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 193, p. p., excl. syn. *Asphodelus tenuiflorus* C. Koch; Миц. 1912, Мат. Фл. Кавк. 2, 4: 121, cum auct. epith. Fisch.; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 608, cum auct. epith. (C. Koch) Misch.; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 21. — *Asphodelus tenuior* Fisch. ex Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 268; Fisch. 1812, Cat. Pl. Hort. Gorenk.: 9, nom. nud.

Описан с Центрального Кавказа: «...in siccis lapidosis Caucasi septentrionalis Cabardinici, ad montem Beschtau et alibi». Lectotypus (Мордак, 2000: 21): «[*Asphodelus*] *tenuior* m[ihi]. Beschtau» (Herb. Bieb. — LE!).

ЗК: Бело-Лаб.; Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.

Эндемик.

4. (216). **A. tenuiflora** (C. Koch) Misch. 1912, Мат. Фл. Кавк. 2, 4: 122; Черняк., 1935, Фл. СССР, 4: 34; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 22. — *Asphodelus tenuiflorus* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 261. — *Asphodelus szovitsii* C. Koch, 1849, l. c.: 261. — *Asphodeline szovitsii* (C. Koch) Misch. 1912, l. c.: 123; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 97, 266; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 608; Прил. 1952, Фл. Азерб. 2: 122; Wendelbo, 1982, in Rech. f. Fl. Iran. 1951: 5. — *A. tenuior* (Fisch.) Ledeb. subsp. *tenuiflora* (C. Koch) E. Tuzlaci var. *tenuiflora* — V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 91.

Описан из Южн. Закавказья: «Im russischen Armenien jenseits des Araxes auf Trachyt, с. 3000' hoch». Типус: ТВИ (fide Matthews, Tuzlaci, 1984: 91).

ЮЗ: Нах. («in m-bus Darry-dagh, in schistose-argillosis, 8 VI 1934, L. Prilipko»).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, зап. Иран).

Sect. 2. Appendicigera E. Tuzlaci

5. (217). **A. taurica** (Pall. ex Bieb.) Kunth, 1843, Enum. Pl. 4: 561; V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 92; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 22; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 383. — *Asphodelus tauricus* Pall. ex Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 279; Pall. 1792, Nova Acta Acad. Sci, Petropol. 10: 309, nom. nud.

Описан по материалам из Крыма и Кавказа: «In Tauriae saxosis calcareis communis, ad Caucasum quoque ad latera montis Beschtau et circa thermas Constantinomontanas». Lectotypus (S. Ikonnikov, 1979: 211, «тип»; T. Leonova, 1968, in sched. LE): [Tauria] «Sudagh. Herb. Pallas» (LE!).

ЗК: Адаг-Пиши., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЦЗ**: Лори (Спитак); **ЮЗЗ**: Араг.

Указан для **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах. (Капеллер, 1941: 456).

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Сирия).

4. (43). Anthericum L.

1. (218). **A. liliago** L. 1753, Sp. Pl.: 310; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 608; V. A. Matthews, 1984, Fl. Turk. 8: 97; Колак, 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 265.

Описан по материалам из Швейцарии, Германии и Франции.

Указан для ЗЗ: Абх. (Мамдзышха, Гроссгейм, 1949: 608; На известняках в Бзыбском ущ. и на Гагрском хр., Колаковский, 1986: 265).

Зап., Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (южн. Турция); Сев. Африка, Сев. Америка.

2. (219). **A. ramosum** L. 1753, Sp. Pl.: 310; V. A. Matthews, 1984, Fl. Turk. 8: 97. Описан из Южной Европы.

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум.

Указан для ЗК: Бело-Лаб. (Галушко, 1978: 152).

Зап., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Superordo Asparaganae

ORDO 11. AMARYLLIDALES

Fam. 165. Hyacinthaceae Batsch

1. (44). *Ornithogalum* L.*

Subgen. 1. *Myogalum* (Link) Peterm.

1. (220). **O. boucheanum** (Kunth) Aschers. 1866, Österr. Bot. Zeitschr. 16: 192; id. 1866, Verhandl. Bot. Vereins: 11–13. — *Myogalum boucheanum* Kunth, 1843, Enum. Pl. 4: 348.

Описан из Европы.

Указан для ЗП («Предкавказье, по опушкам» Гроссгейм, 1928: 228; он же, 1940: 162; он же, 1949: 622; Крашенинников, 1935: 393).

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа.

Subgen. 2. *Beryllis* (Salisb.) Baker

2. (221). **O. ponticum** Zahar. 1965, Rev. Roum. Biol. (Bot.) 10, 4: 290. — *O. georgicum* Агарова, 1966, Бот. журн. 51, 9: 1314. — *O. pyrenaicum* auct. non L.: Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 228; он же, 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 162; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 622; Краш. 1935, Фл. СССР, 4: 391; Сосн. 1941, Фл. Груз. 2: 503; Исаев, 1952, Фл. Азерб. 2: 177; Шхиян, 1969, Фл. Груз. изд. 2, 2: 317; Косенко, 1970, Определ. высш. раст. сев.-зап. Кавк. и Предкавк.: 529; Сахок., Хуцишвили, 1975, Консп. высш. раст. Хеви: 165, р.р. — *O. narbonense* auct. non L.: Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 276; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 158; Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 214; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 228, р. р.

Описан из Центрального Закавказья. Tur u s: «Caucasus, Tbilisi, lg. A. Schchian» (BUCA).

ЗП; ВП: Тер.-Сулак. (Хасавюртовский р-н); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Краснодарский край, Северский р-н); **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Занг.; **Т:**

Указан для ВП: В. Ставр., Тер.-Кум. (sub nom. *O. pyrenaicum*: Крашенинников, 1935: 391; Гроссгейм, 1940: 162, карта № 186, он же, 1949: 622; sub nom. *O. ponticum*: Иванов, 2001: 36); **ЗК:** Уруп-Теб.; **ВК:** В. Сулак.; **ЦК:** Малк. (sub nom.

*Н. Д. Агапова