

Fam. 164. **Asphodelaceae** Juss.*

1. (40). **Eremurus** Bieb.

Subgen. 1. **Eremurus**

Ser. 1. **Eremurus**

Ser. *Spectabiles* A. Khokhr. 1965

1. (207). **E. spectabilis** Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 269, nom. cons.; V. A. Matthews, 1984, Fl. Turk. 8: 87; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 386. — *E. caucasicus* Stev. 1832, Bull. Soc. Nat. Moscou, 4: 251. — *E. spectabilis* subsp. *spectabilis*, — Wendelbo, 1982, in Rech. f. Fl. Iran. 151: 14.

Описан по материалам с Северного Кавказа и Крыма: «...in campis elatis promontorii Caucasi septentrionalis inter fluvium Kuman et rivum Sablja, ad viam publicam. Eundem in Tauriae maxime meridionalis rupestribus reperit D. Steven». Турус: *Eremurus* [*Erymnurus*], err.] caucasicus. «In montibus haud procul Sabli promont. Caucasicum ad viam publicam quae ... ad pagum Alexandria 1813» (Herb. Bieb. — LE!) тип. cons. 2005.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ВК:** Кубин. (Рзазаде, 1952: 123); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ахур. (Капеллер. 1941: 457).

Юго-Вост. (Крым) Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия.

Ф. Биберштейн (1819: 269) в протокол к *E. spectabilis* включил в качестве синонима раннее видовое название *Asphodelus altaicus* Pall., 1779. Таким образом, название *E. spectabilis* является незаконным, как излишнее название (nom. superfl.) и поэтому N. Turland (2000, Тахон, 49, 1: 97) предложил консервацию названия *E. spectabilis* с типом, процитированным выше. Это предложение было принято XVII Международным ботаническим конгрессом в 2005 г. в Вене.

2. (208). **E. tauricus** Stev. 1832, Bull. Soc. Nat. Moscou, 4: 253; Харкев. 1964, Бот. журн. 49, 2: 259.

Описан из Крыма: «Tauriae littoralis Nikitae».

СЗЗ: Анап.-Гел. (окр. Новороссийска).

Юго-Вост. Европа (Крым).

3. (209). **E. azerbaijdzhanicus** Charkev. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 45.

Описан по культивируемому образцу, происходящему из Азербайджана. Турус: «Выращен в Киеве, в Центральном республиканском ботаническом саду АН УССР из корневых систем, завезенных весной 1959 г. из Шекинского нагорья (окр. с. Халдан, Азербайджанской ССР). 26. 05. 1961. С. С. Харкевич». (LE!, isotypus — KW).

ВЗ: Иорск.-Шек.

Эндемик.

4. (210). **E. zangezuristicus** Mikheev, 1996, Бот. журн. 81, 5: 79; он же, 2004, Новости сист. высш. раст. 36: 104. — *E. spectabilis* auct. non Bieb.: Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 386, p. p.

*Е. В. Мордак, К. Г. Таманян

Описан по культивируемому образцу, происходящему из Армении. Turus: «Растение, выращенное из корневищ, собранных в Армении южнее г. Гориса на сухих травянистых с кустарниками крутых щебнистых склонах. 15. 07. 1994 г. А. Михеев». (LE!).

ЮЗ: Занг.

Эндемик.

2. (41). *Asphodelus* L.

1. (211). *A. fistulosus* L. 1753, Sp. Pl.: 309; V. A. Matthews, 1984, Fl. Turk. 8: 85; Аскерова, 1997, Бот. журн. 82, 3: 94.

Описан по материалам из Франции, Испании и Крита.

ВЗ: Ширв. (Апшерон). Заносный.

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (зап. и южн. Турция); Сев. Африка.

2. (212). *A. tenuifolius* Cav. 1801, Anal. Ciens. Nat. 3: 46; Wendelbo, 1982, in Rech. f. Fl. Iran. 151: 4; id. 1985, Fl. Iraq 8: 57; Аскерова, 1997, Бот. журн. 82, 3: 94.

Описан из Африки. Turus: «de Mogador en África, Broussonet». (МА).

Т («Ленкоранский р-н, терр. Института многолетних насаждений, на плантациях. 7 VIII 1945. Л. Прилипко». ВАК). Заносный.

Средиз.; Юго-Зап. Азия; Африка.

3. (42). *Asphodeline* Reichenb.

Sect. 1. *Asphodeline*

1. (213). *A. prolifera* (Bieb.) Kunth, 1843, Enum. Pl. 4: 563; Миц. 1912, Мат. Фл. Кавк. 2, 4: 124; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 20. — *Asphodelus prolifera* Bieb. I, 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 280. — *Anthericum dendroides* Hoffm. VI, 1808, Comment. Soc. Phys.-Med. Univ. Mosq. 1, 1: 43; Stev. 1812, Mem. Soc. Nat. Moscou, 3: 249, 261. — *Asphodeline dendroides* (Hoffm.) Woronow, 1914, Тр. Тифл. бот. сада, 12, 2: 28, Sched. Herb. Fl. Cauc. N 57; Черняк. 1935, Фл. СССР, 4: 32; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 97; Капеллер, 1941, Фл. Груз. 2: 455; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 608; Прил. 1952, Фл. Азерб. 2: 121; Wendelbo, 1982, in Rech. f. Fl. Iran. 151: 5; V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 96; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 380.

Описан из Армении (Ахтала): «... in Armeniae ibericae campis editis. Legi ad torrentem Debeda, prope metallifodinas Achtalenses». Lectotypus (Мордак, 2000: 20): «Ex Armenia iberica? a. 1802». (Herb. Bieb. — LE!).

ВК: Кубин.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Иорск.-Шек., Шир., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; ЮЗЗ: Араг.; ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; Т (Зуванд).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, зап. Иран).

2. (214). *A. lutea* (L.) Reichenb. 1830, Fl. Germ. Excurs.: 116; V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 89; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 383. — *Asphodelus luteus* L. 1753, Sp. Pl.: 309.

Описан из Сицилии.

ЗК: Адаг.-Пишиш.; ЦК: В. Кум., Малк.; СЗЗ: Анап.-Гел.; ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. (Они); ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Мург.-Муровд. (окр. Иджевана, редко).