

Описан по культивируемому образцу, происходящему из Армении. Turus: «Растение, выращенное из корневищ, собранных в Армении южнее г. Гориса на сухих травянистых с кустарниками крутых щебнистых склонах. 15. 07. 1994 г. А. Михеев». (LE!).

ЮЗ: Занг.

Эндемик.

2. (41). *Asphodelus* L.

1. (211). *A. fistulosus* L. 1753, Sp. Pl.: 309; V. A. Matthews, 1984, Fl. Turk. 8: 85; Аскерова, 1997, Бот. журн. 82, 3: 94.

Описан по материалам из Франции, Испании и Крита.

ВЗ: Ширв. (Апшерон). Заносный.

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (зап. и южн. Турция); Сев. Африка.

2. (212). *A. tenuifolius* Cav. 1801, Anal. Ciens. Nat. 3: 46; Wendelbo, 1982, in Rech. f. Fl. Iran. 151: 4; id. 1985, Fl. Iraq 8: 57; Аскерова, 1997, Бот. журн. 82, 3: 94.

Описан из Африки. Turus: «de Mogador en África, Broussonet». (МА).

Т («Ленкоранский р-н, терр. Института многолетних насаждений, на плантациях. 7 VIII 1945. Л. Прилипко». ВАК). Заносный.

Средиз.; Юго-Зап. Азия; Африка.

3. (42). *Asphodeline* Reichenb.

Sect. 1. *Asphodeline*

1. (213). *A. prolifera* (Bieb.) Kunth, 1843, Enum. Pl. 4: 563; Миц. 1912, Мат. Фл. Кавк. 2, 4: 124; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 20. — *Asphodelus prolifera* Bieb. I, 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 280. — *Anthericum dendroides* Hoffm. VI, 1808, Comment. Soc. Phys.-Med. Univ. Mosq. 1, 1: 43; Stev. 1812, Mem. Soc. Nat. Moscou, 3: 249, 261. — *Asphodeline dendroides* (Hoffm.) Woronow, 1914, Тр. Тифл. бот. сада, 12, 2: 28, Sched. Herb. Fl. Cauc. N 57; Черняк. 1935, Фл. СССР, 4: 32; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 97; Капеллер, 1941, Фл. Груз. 2: 455; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 608; Прил. 1952, Фл. Азерб. 2: 121; Wendelbo, 1982, in Rech. f. Fl. Iran. 151: 5; V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 96; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 380.

Описан из Армении (Ахтала): «... in Armeniae ibericae campis editis. Legi ad torrentem Debeda, prope metallifodinas Achtalenses». Lectotypus (Мордак, 2000: 20): «Ex Armenia iberica? a. 1802». (Herb. Bieb. — LE!).

ВК: Кубин.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Иорск.-Шек., Шир., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; ЮЗЗ: Араг.; ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; Т (Зуванд).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, зап. Иран).

2. (214). *A. lutea* (L.) Reichenb. 1830, Fl. Germ. Excurs.: 116; V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 89; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 383. — *Asphodelus luteus* L. 1753, Sp. Pl.: 309.

Описан из Сицилии.

ЗК: Адаг.-Пишиш.; ЦК: В. Кум., Малк.; СЗЗ: Анап.-Гел.; ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. (Они); ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Мург.-Муровд. (окр. Иджевана, редко).

Указан для **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб. (Галушко, 1978: 152); **ЗЗ**: Адж. (сел. Шуахеви) (Дмитриева, 1990: 139).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Палестина, Иордания).

3. (215). **A. tenuior** (Fisch. ex Bieb.) Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 193, p. p., excl. syn. *Asphodelus tenuiflorus* C. Koch; Миц. 1912, Мат. Фл. Кавк. 2, 4: 121, cum auct. epith. Fisch.; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 608, cum auct. epith. (C. Koch) Misch.; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 21. — *Asphodelus tenuior* Fisch. ex Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 268; Fisch. 1812, Cat. Pl. Hort. Gorenk.: 9, nom. nud.

Описан с Центрального Кавказа: «...in siccis lapidosis Caucasi septentrionalis Cabardinici, ad montem Beschtau et alibi». Lectotypus (Мордак, 2000: 21): «[*Asphodelus*] *tenuior* m[ihi]. Beschtau» (Herb. Bieb. — LE!).

ЗК: Бело-Лаб.; Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.

Эндемик.

4. (216). **A. tenuiflora** (C. Koch) Misch. 1912, Мат. Фл. Кавк. 2, 4: 122; Черняк., 1935, Фл. СССР, 4: 34; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 22. — *Asphodelus tenuiflorus* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 261. — *Asphodelus szovitsii* C. Koch, 1849, l. c.: 261. — *Asphodeline szovitsii* (C. Koch) Misch. 1912, l. c.: 123; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 97, 266; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 608; Прил. 1952, Фл. Азерб. 2: 122; Wendelbo, 1982, in Rech. f. Fl. Iran. 1951: 5. — *A. tenuior* (Fisch.) Ledeb. subsp. *tenuiflora* (C. Koch) E. Tuzlaci var. *tenuiflora* — V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 91.

Описан из Южн. Закавказья: «Im russischen Armenien jenseits des Araxes auf Trachyt, с. 3000' hoch». Typus: ТБИ (fide Matthews, Tuzlaci, 1984: 91).

ЮЗ: Нах. («in m-bus Darry-dagh, in schistose-argillosis, 8 VI 1934, L. Prilipko»).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, зап. Иран).

Sect. 2. Appendicigera E. Tuzlaci

5. (217). **A. taurica** (Pall. ex Bieb.) Kunth, 1843, Enum. Pl. 4: 561; V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 92; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 22; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 383. — *Asphodelus tauricus* Pall. ex Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 279; Pall. 1792, Nova Acta Acad. Sci, Petropol. 10: 309, nom. nud.

Описан по материалам из Крыма и Кавказа: «In Tauriae saxosis calcareis communis, ad Caucasum quoque ad latera montis Beschtau et circa thermas Constantinomontanas». Lectotypus (S. Ikonnikov, 1979: 211, «тип»; T. Leonova, 1968, in sched. LE): [Tauria] «Sudagh. Herb. Pallas» (LE!).

ЗК: Адаг-Пиши., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЦЗ**: Лори (Спитак); **ЮЗЗ**: Араг.

Указан для **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах. (Капеллер, 1941: 456).

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Сирия).

4. (43). Anthericum L.

1. (218). **A. liliago** L. 1753, Sp. Pl.: 310; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 608; V. A. Matthews, 1984, Fl. Turk. 8: 97; Колак, 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 265.

Описан по материалам из Швейцарии, Германии и Франции.