

Указан для **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Тиб. (Галушко, 1978: 152); **ЗЗ**: Адж. (сел. Шуахеви) (Дмитриева, 1990: 139).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Палестина, Иордания).

3. (215). **A. tenuior** (Fisch. ex Bieb.) Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 193, p. p., excl. syn. *Asphodelus tenuiflorus* C. Koch; Миц. 1912, Мат. Фл. Кавк. 2, 4: 121, cum auct. epith. Fisch.; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 608, cum auct. epith. (C. Koch) Misch.; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 21. — *Asphodelus tenuior* Fisch. ex Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 268; Fisch. 1812, Cat. Pl. Hort. Gorenk.: 9, nom. nud.

Описан с Центрального Кавказа: «...in siccis lapidosis Caucasi septentrionalis Cabardinici, ad montem Beschtau et alibi». Lectotypus (Мордак, 2000: 21): «[*Asphodelus*] *tenuior* m[ihi]. Beschtau» (Herb. Bieb. — LE!).

ЗК: Бело-Лаб.; Уруп-Тиб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.

Эндемик.

4. (216). **A. tenuiflora** (C. Koch) Misch. 1912, Мат. Фл. Кавк. 2, 4: 122; Черняк., 1935, Фл. СССР, 4: 34; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 22. — *Asphodelus tenuiflorus* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 261. — *Asphodelus szovitsii* C. Koch, 1849, l. c.: 261. — *Asphodeline szovitsii* (C. Koch) Misch. 1912, l. c.: 123; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 97, 266; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 608; Прил. 1952, Фл. Азерб. 2: 122; Wendelbo, 1982, in Rech. f. Fl. Iran. 1951: 5. — *A. tenuior* (Fisch.) Ledeb. subsp. *tenuiflora* (C. Koch) E. Tuzlaci var. *tenuiflora* — V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 91.

Описан из Южн. Закавказья: «Im russischen Armenien jenseits des Araxes auf Trachyt, с. 3000' hoch». Типус: ТБИ (fide Matthews, Tuzlaci, 1984: 91).

ЮЗ: Нах. («in m-bus Darry-dagh, in schistose-argillosis, 8 VI 1934, L. Prilipko»).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, зап. Иран).

Sect. 2. Appendicigera E. Tuzlaci

5. (217). **A. taurica** (Pall. ex Bieb.) Kunth, 1843, Enum. Pl. 4: 561; V. A. Matthews, E. Tuzlaci, 1984, Fl. Turk. 8: 92; Мордак, 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 22; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 383. — *Asphodelus tauricus* Pall. ex Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 279; Pall. 1792, Nova Acta Acad. Sci, Petropol. 10: 309, nom. nud.

Описан по материалам из Крыма и Кавказа: «In Tauriae saxosis calcareis communis, ad Caucasum quoque ad latera montis Beschtau et circa thermas Constantinomontanas». Lectotypus (S. Ikonnikov, 1979: 211, «тип»; T. Leonova, 1968, in sched. LE): [Tauria] «Sudagh. Herb. Pallas» (LE!).

ЗК: Адаг-Пиши., Бело-Лаб., Уруп-Тиб.; **ЦК**: В. Кум.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЦЗ**: Лори (Спитак); **ЮЗЗ**: Араг.

Указан для **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах. (Капеллер, 1941: 456).

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Сирия).

4. (43). Anthericum L.

1. (218). **A. liliago** L. 1753, Sp. Pl.: 310; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 608; V. A. Matthews, 1984, Fl. Turk. 8: 97; Колак, 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 265.

Описан по материалам из Швейцарии, Германии и Франции.

Указан для ЗЗ: Абх. (Мамдзышха, Гроссгейм, 1949: 608; На известняках в Бзыбском ущ. и на Гагрском хр., Колаковский, 1986: 265).

Зап., Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (южн. Турция); Сев. Африка, Сев. Америка.

2. (219). **A. ramosum** L. 1753, Sp. Pl.: 310; V. A. Matthews, 1984, Fl. Turk. 8: 97. Описан из Южной Европы.

ЗК: Уруп-Теб.; ЦК: В. Кум.

Указан для ЗК: Бело-Лаб. (Галушко, 1978: 152).

Зап., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Superordo Asparaganae

ORDO 11. AMARYLLIDALES

Fam. 165. Hyacinthaceae Batsch

1. (44). *Ornithogalum* L.*

Subgen. 1. *Myogalum* (Link) Peterm.

1. (220). **O. boucheanum** (Kunth) Aschers. 1866, Österr. Bot. Zeitschr. 16: 192; id. 1866, Verhandl. Bot. Vereins: 11–13. — *Myogalum boucheanum* Kunth, 1843, Enum. Pl. 4: 348.

Описан из Европы.

Указан для ЗП («Предкавказье, по опушкам» Гроссгейм, 1928: 228; он же, 1940: 162; он же, 1949: 622; Крашенинников, 1935: 393).

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа.

Subgen. 2. *Beryllis* (Salisb.) Baker

2. (221). **O. ponticum** Zahar. 1965, Rev. Roum. Biol. (Bot.) 10, 4: 290. — *O. georgicum* Агарова, 1966, Бот. журн. 51, 9: 1314. — *O. pyrenaicum* auct. non L.: Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 228; он же, 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 162; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 622; Краш. 1935, Фл. СССР, 4: 391; Сосн. 1941, Фл. Груз. 2: 503; Исаев, 1952, Фл. Азерб. 2: 177; Шхиян, 1969, Фл. Груз. изд. 2, 2: 317; Косенко, 1970, Определ. высш. раст. сев.-зап. Кавк. и Предкавказ.: 529; Сахок., Хуцишвили, 1975, Консп. высш. раст. Хеви: 165, р.р. — *O. narbonense* auct. non L.: Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 276; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 158; Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 214; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 228, р. р.

Описан из Центрального Закавказья. Tur u s: «Caucasus, Tbilisi, lg. A. Schchian» (BUCA).

ЗП; ВП: Тер.-Сулак. (Хасавюртовский р-н); ЗК: Адаг.-Пшиш. (Краснодарский край, Северский р-н); ЦК: В. Кум., В. Тер.; ВК: Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; СЗЗ: Анап.-Гел.; ЗЗ: Абх., Рион.-Квир., Адж.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; ЮЗ: Занг.; Т.

Указан для ВП: В. Ставр., Тер.-Кум. (sub nom. *O. pyrenaicum*: Крашенинников, 1935: 391; Гроссгейм, 1940: 162, карта № 186, он же, 1949: 622; sub nom. *O. ponticum*: Иванов, 2001: 36); ЗК: Уруп-Теб.; ВК: В. Сулак.; ЦК: Малк. (sub nom.

*Н. Д. Агапова