

Указан для ЗЗ: Абх. (Мамдзышха, Гроссгейм, 1949: 608; На известняках в Бзыбском ущ. и на Гагрском хр., Колаковский, 1986: 265).

Зап., Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (южн. Турция); Сев. Африка, Сев. Америка.

2. (219). **A. ramosum** L. 1753, Sp. Pl.: 310; V. A. Matthews, 1984, Fl. Turk. 8: 97. Описан из Южной Европы.

ЗК: Уруп-Теб.; ЦК: В. Кум.

Указан для ЗК: Бело-Лаб. (Галушко, 1978: 152).

Зап., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Superordo Asparaganae

ORDO 11. AMARYLLIDALES

Fam. 165. Hyacinthaceae Batsch

1. (44). *Ornithogalum* L.*

Subgen. 1. *Myogalum* (Link) Peterm.

1. (220). **O. boucheanum** (Kunth) Aschers. 1866, Österr. Bot. Zeitschr. 16: 192; id. 1866, Verhandl. Bot. Vereins: 11–13. — *Myogalum boucheanum* Kunth, 1843, Enum. Pl. 4: 348.

Описан из Европы.

Указан для ЗП («Предкавказье, по опушкам» Гроссгейм, 1928: 228; он же, 1940: 162; он же, 1949: 622; Крашенинников, 1935: 393).

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа.

Subgen. 2. *Beryllis* (Salisb.) Baker

2. (221). **O. ponticum** Zahar. 1965, Rev. Roum. Biol. (Bot.) 10, 4: 290. — *O. georgicum* Агарова, 1966, Бот. журн. 51, 9: 1314. — *O. pyrenaicum* auct. non L.: Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 228; он же, 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 162; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 622; Краш. 1935, Фл. СССР, 4: 391; Сосн. 1941, Фл. Груз. 2: 503; Исаев, 1952, Фл. Азерб. 2: 177; Шхиян, 1969, Фл. Груз. изд. 2, 2: 317; Косенко, 1970, Определ. высш. раст. сев.-зап. Кавк. и Предкавк.: 529; Сахок., Хуцишвили, 1975, Консп. высш. раст. Хеви: 165, р.р. — *O. narbonense* auct. non L.: Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 276; Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 158; Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 214; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 228, р. р.

Описан из Центрального Закавказья. Tur u s: «Caucasus, Tbilisi, lg. A. Schchian» (BUCA).

ЗП; ВП: Тер.-Сулак. (Хасавюртовский р-н); ЗК: Адаг.-Пшиш. (Краснодарский край, Северский р-н); ЦК: В. Кум., В. Тер.; ВК: Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; СЗЗ: Анап.-Гел.; ЗЗ: Абх., Рион.-Квир., Адж.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; ЮЗ: Занг.; Т.

Указан для ВП: В. Ставр., Тер.-Кум. (sub nom. *O. pyrenaicum*: Крашенинников, 1935: 391; Гроссгейм, 1940: 162, карта № 186, он же, 1949: 622; sub nom. *O. ponticum*: Иванов, 2001: 36); ЗК: Уруп-Теб.; ВК: В. Сулак.; ЦК: Малк. (sub nom.

*Н. Д. Агапова

O. pyrenaicum: Гроссгейм, 1940: 162, карта № 186; он же, 1949: 622; Сахокия, Хуцишвили, 1975: 165); для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1978: 157, sub nom. *O. ponticum*); СЗЗ; ЗЗ; ВЗ (sub nom. *O. pyrenaicum*: Крапешинников, 1935: 391; Гроссгейм, 1940: 162, карта № 186; он же, 1949: 622); для всех районов Азербайджана (Исаев, 1952: 177).

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия.

3. (222). *O. flavescens* Lam. 1778, Fl. Fr. 3: 277, tab. 232, fig. 2; Краш. 1935, Фл. СССР, 4: 390; Агапова, 1977, Бот. журн. 62, 7: 975. — *O. pyrenaicum* auct. non L.: Cullen, 1984, Fl. Turk. 8: 232.

Описан из Франции: «... dans les environs de Paris».

ЗП: Аз.-Куб. (Краснодарский край, Таманский п-ов, окр. пос. Тамань, окр. мыса Ахиллеон, окр. пос. Приазовское).

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

4. (223). *O. hajastanum* Agarova, 1966, Бот. журн. 51, 9: 1313; Агапова, Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 232. — *O. ponticum* subsp. *obconicum* Zahar. 1965, Rev. Roum. Biol. (Bot.) 10, 1: 290; Агапова, 1972, Тахт., Фед. Фл. Ерев.: 324. — *O. obconicum* (Zahar.) Agarova, 1967, Бот. журн. 52, 12: 1751, nom. superfl. — *O. pyrenaicum* auct. non L.: Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 228; он же, 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 162; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 622; Краш. 1935, Фл. СССР, 4: 391, р. р. — *O. narbonense* auct. non L.: Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 228, р. р.; Аскерова, Гарахани, 1998, Новости сист. высш. раст. 31: 37.

Описан из Южного Закавказья. Туркус: «Армянская ССР, окр. Еревана, Джрвеж, 12. VI. 1963, среди камней, Н. Д. Агапова» (LE, cum isotypi).

ЦЗ: Лори (Базумский хр.); ВЗ: Мург-Муровд. (Ноемберянский р-н Армении); ЮЗЗ: Араг; ЮЗ.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция: Карс, Кагызман, Сарыкамыш, Артвин).

5. (224). *O. fischerianum* Krasch. 1935, Фл. СССР, 4: 392. — *O. brachystachys* Fisch. 1812, Cat. Jard. pl. Gorenki: 9, nom. nud. non C. Koch — *O. narbonense* var. *minus* Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 158. — *O. narbonense* var. *brachystachyum* Fisch.: Шмальгаузен, 1897, Фл. Ср. Южн. Росс. 2: 501.

Описан из «Южной России». Lectotypus (Kudrjaschova, hoc loco): «*Ornithogalum narbonense* var. *brachystachyum* Fisch. Sarepta. May 27. 1851. Becker» (LE!).

ЗП: З. Ставр. («Больше-Дербетовский Улус. 9. V. 1915. N 122. И. Новопокровский.»)

Указан для ВП: В. Ставр. (Галушко, 1978: 157; Танфильев, Кононов, 1987: 27; Иванов, 2001: 36); ЦК: Малк. (Галушко, 1978: 157).

Вост. Европа (южн.); Ср. Азия (Казахстан.)

6. (225). *O. brachystachys* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 248; Агапова, Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 235. — *O. narbonense* L. subsp. *brachystachys* (C. Koch) Feinb. 1986, Fl. Palest. 4: 51, — quoad nom. *O. narbonense* auct. non L.: Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 214, р. р.; Cullen, 1984, Fl. Turk. 8: 233, р. р. — non *O. brachystachys* C. Koch: Wendelbo, 1985, Fl. Iraq: 91, nec Rech. f. 1990, Fl. Iran. 165: 123.

Описан из северо-восточной Турции. Туркус: «Im Tschabantzhale, с. 5600' auf Poghrug, C. Koch» (В? isotypus — G — VOIS), fide Агапова, Габриэлян, 2001: 235.

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах. (Шахбузский и Ордубадский р-ны), Мерг.-Зан.; **Т.**

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Поскольку считалось, что тип вида погиб в В, был установлен неотип: «Армянская ССР, Котайский р-н, сухой склон близ монастыря Аменапркич, 22. 6. 1963 г., цв. Н. Агапова», LE (Агапова, 1967, Бот. журн. 52, 12: 1753). Однако Э. Ц. Габриэлян обнаружен и выделен изотип этого вида в гербарии Boissier в Женеве.

Авторы «флор» соседних регионов (Wendelbo, 1985, Fl. Iraq: 91; Rechinger, 1990, Fl. Iran. 165: 123, tab. 100), приводя *O. brachystachys*, подразумевают под этим названием другой вид, близкий *O. narbonense* L., с хорошо выраженной зеленой полоской на наружной стороне долей околоцветника, длинными прицветниками, иногда с пильчатым краем листа. В первоописании Коха признаками вида указаны доли околоцветника с буровато-охристыми жилками, мелкопильчатый край листа. Feinbrun (1986, Fl. Palestinae: 52) считала *O. brachystachys* подвигом *O. narbonense*, а Cullen (1984, Fl. Turk.: 234) полагал, что название «*O. brachystachys*» использовалось для мелких растений *O. narbonense*.

7. (226). **O. arcuatum** Stev. aggr.

7а. **O. arcuatum** Stev. 1829, Mem. Soc. Nat. Moscou, 7: 271; Аскерова, Гарахани, 1998, Новости сист. высш. раст. 31: 38. — *O. magnum* auct. non Krasch. et Schischk.: Прил., 1973, Новости сист. высш. раст. 10: 344.

Описан из Центрального Кавказа. Туркус: «Caucasus, Beshtau, 22 majo 1827, leg. Chr. Steven» (Н, photo — LE!). Specimen authenticum: «*Ornithogalum arcuatum* (m.) [Stev.] ex Horto e bulbi Caucasus. Herb. Ledebour [988.2]» (LE!).

ЗП: З. Ставр. (окр. Ставрополя); **ЗК:** Адаг-Пшиш. (Краснодарский край, Северский р-н, р. Афипис), Бело-Лаб. (между ст. Чохрак и Лабинской); **ЦК:** В. Кум.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.

Указан для Предкавказья: **ЗП:** Аз.-Куб. (Липский, 1899: 465; Косенко, 1970: 530); **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 157); **ЗК:** (Гроссгейм, 1940, карта № 185); **ЦК:** В.-Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 157); **ВЗ:** Ширв. («хр. Аладаш, окр. сел. Ярымджа, 1400–1500 м» — Прилипко, 1973: 342, sub nom. *O. magnum*).

Юго-Вост. Европа (Крым: г. Старый Крым — Агапова, 1977: 977).

7б. **O. schelkovnikovii** Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 228; Гроссг. 1929, Журн. русск. ботан. общ. 14, 3: 302; Агапова, Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 236. — *O. arcuatum* auct. non Stev.: Cullen, 1984, Fl. Turk. 8: 234; Wendelbo, 1985, Fl. Iraq, 8: 90; Rech. f. 1990, Fl. Iran. 165: 123.

Описан из Южного Закавказья (Ар.: Эр. Нах. 1800–2500 м. На субальпийских и альпийских лугах). Lectotypus (Габриэлян, 2001: 36): «Armenia, in m-te Karny-Jarych [Арайлер], 1800 m, ad marginem silvae, 9 et 13. VII. 1926, A. Schelkovnikov» (ERE 18403, isolectotypus — LE!). Syntypus: «Transcaucasia, Zangezur, in trajecto Bitschenach, 2100 m. In pascuis alpinis. 25. VIII. [19] 26. A. Grossheim et P. Jaroshenko» (Гроссгейм, 1940: 164, «классическое место Биченагский пер.»).

ВЗ: Мург.-Муровд. (Иджеванский р-н); **ЮЗЗ:** Араг. (гора Арагац); **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг.

Юго-Зап. Азия (Турция: Такялты, оз. Бялык-Гель; сев.-вост. Ирак; зап. Иран).

7с. **O. magnum** Krasch. et Schischk. 1935, Фл. СССР, 4: 743, 391. — *O. arcuatum* auct. non Stev. 1829: Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 215.

Описан из Центрального Кавказа (окр. пос. Иноземцево «Карасс» близ Пятигор-

ска). *Typus*: «Caucasus, inter frutices et in vinetis prope Karass, fl.-fr. — Hohenacker» (LE! cum 3 isotypi).

ЦК: В. Кум.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (Сагурамский заповедник, у мон. Зедазени); **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.

Указан для **ЗК** (Гроссгейм, 1940: 163, карта № 187; он же, 1949: 623); **ВЗ** (Крашенинников, 1935: 392; Шхиян, 1969: 318).

Эндемик.

А. Д. Михеев, изучавший *O. arcuatum* и *O. magnum* из locus classicus обоих видов в течение многих лет, считает *O. magnum* тождественным *O. arcuatum* (Михеев, 1984, 2004).

Subgen. 3. *Ornithogalum*

8. (227). ***O. montanum*** Cyt. (1811–1815) in M. Tenore, Fl. Nap. 1, 1: 22, 176; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 231; Агапова, 1972, Тахт., Фед., Фл. Ерев.: 324; Агапова, Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 237. — *O. platyphyllum* Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 5: 65; Краш. 1935, Фл. СССР, 4: 389; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 164. — *O. graciliflorum* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 248; Краш. 1935, Фл. СССР, 4: 389, р. р.; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 164; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 624; Исаев, 1952, Фл. Азерб. 2: 178, р. р. — *O. montanum* Cyt. var. *platyphyllum* (Boiss.) Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 217. — *O. cuspidatum* auct. non Bertol. 1839, Fl. Ital. 4: 99; Wendelbo, 1985, Fl. Iraq: 93; Rech. f., 1990, Fl. Iran. 165: 130.

Описан из Италии.

ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ**; **Т**.

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

9. (228). ***O. tempskyanum*** Freyn et Sint. 1896, Bull. Herb. Boiss. 4: 188; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 230; он же, 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 165; Агапова, 1972, Тахт., Фед., Фл. Ерев.: 324; Агапова, Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 241. — *O. graciliflorum* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 248; Краш. 1935, Фл. СССР, 4: 389; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 164; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 624, р. р. — *O. platyphyllum* auct. non Boiss.: Cullen, 1984, Fl. Turk. 8: 236.

Описан из северо-восточной Турции. *Typus*: «Armenia turcica, Szandschak Gümüşkhane: Stadodopi in prat. subalp. humid 10. VII. 1894, № 6262, Sintenis» (isotypus — LE!).

ЮЗЗ: Араг. (с. Ширакаван, Нор-Амберд, Архашанское ущ.), Месх. (Ахалцихский р-н, между сел. Эркота и Тбачура; Аспиндза); **ЮЗ**: Ерев., Севан.

Юго-Зап. Азия (Турция: Карсская обл.: Саганлугский и Кара-Даширский хребты; Сарыкамыш, Ерзинкан; на границе Персидского и Турецкого Курдистана, пер. Зани-Гядук).

Первоначально J. Cullen (1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 27, 3) приводил *O. tempskyanum* для флоры Турции, но считал, что это неясный вид, а позднее (1984, Fl. Turk. 8: 236) указывал его в качестве синонима *O. platyphyllum*. Вероятнее всего, этот вид смешивают с *O. montanum* Cyt. s. l., так как самый характерный признак — специфическое строение завязи и коробочки — не всегда может быть выявлен на гербарных экземплярах (Агапова, 1966).

10. (229). ***O. hyrcanum*** Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 230; Гроссг. 1929, Журн. рус. бот. об-ва, 14, 3: 303. — *O. bungei* auct. non Boiss.: Rech. f., 1990, Fl. Iran. 165: 124, quoad plantae Talyschensis.

Описан из Талыша: «Ленкоранский уезд, 1000–1200 м, в горных лесах». *Lectotypus* (Гроссгейм, 1929, цит. соч.: 304): «*Districtus Lencoran, Talysch, Lyrik*. № 414 *Majo* 1880, fl. *Radde*» (LE! cum 2 *isolectotypi*!).

T (Лерик, между сел. Орант и Шинабад; Ярдымлинский р-н, окрестности сел. Даг-Узу, гора Узун-Баши, 2200 м н. у. м.).

Эндемик.

11. (230). **O. gabrielianiae** Agarova, 1997, *Willdenowia*, 27: 199; Агапова, Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 240.

Описан из Южного Закавказья. *Typus*: «Армения, гора Арагац, выше верхней границы дубового редколесья, 2600 м, 12. VII. 1977 цв., Э. Габриэлян» (ERE; *isolectotypi* — В, ERE, К, LE!).

ЮЗЗ: Араг.

Эндемик.

12. (231). **O. transcaucasicum** Miscz. ex Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 230; Агапова, Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 244.

Описан из Армении: «Из окрестностей оз. Севан, 1800–2200 м». *Lectotypus* (Габриэлян, 2001: 245): [Armenia] «*Distr. Novo-Bajazet, in jugo Artshanutz prope pagum Tzamakapert, 6300–8000'*. 28. 6. 1923. O. *Zedelmeier et A. Shelkovnikov*» (ERE 18406).

ЦЗ: Лори (сел. Русские Гергеры, Джелал-Оглы); **ВЗ**: Мург.-Муровд. (окр. Кировакана, горы Маймех, 2800 м н. у. м., Сергех, 2600 м н. у. м.); **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах., Араг. (гора Арагац); **ЮЗ**: Ерев. (Цахкадзор, гора Алибек), Севан., Дар., Нах.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция: Карсская обл., Кагызманский округ, ст. Про-межуточная, окр. Сарыкамыш).

13. (232). **O. balansae** Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 222; Агапова, Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 243. — *O. schmalhauseni* Albov, 1891, Тр. Одесск. отд. рос. об-ва садовод. 1890: 15; Краш. 1935, Фл. СССР, 4: 385; Колак. 1938, Фл. Абх. 1: 255; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 161; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 623; Сосн., 1941, Фл. Груз. 2: 502; Исаев, 1952, Фл. Азерб. 2: 180; Сахокия, Хуцишвили, 1975, Консп. фл. высш. раст. Хеви: 165; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 156; Иванов, 2001, Конспект флоры Ставрополя: 36. — *O. balansae* Boiss. var. *stenophyllum* Albov, 1893, Bull. Herb. Boiss. 1, 1: 260. — *O. oligophyllum* auct. non Clar.: Cullen, 1984, Fl. Turk. 8: 235.

Описан из Турции. *Typus*: «*Inter Baiburt et Erzeroum, 8000–9000 p. ad nives m-tes Kolagh-Dagh Armenia* 5. 1853, fl. *Huet du Pavillon*» (G — VOIS, *isotypus* — LE!).

ЗП: З. Ставр.; **СЗЗ**; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх. (хр. Берчиль, Мамздышха, Бзыбский хр.), Инг.-Рион., Рион.-Квир. (Кутаис. р-н, плато Асхи); **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (пер. Бибильты-вцэг, 2380 м н. у. м.; Боржоми, Цхра-Цкаро); **ЮЗЗ**: Месх. (Беюк-Пикаль), Джав.-В. Ах. (гора Б. Абул), Араг. (уроч. Пулузе-Араг, 2800 м н. у. м.); **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Нах. (близ сел. Биченак).

Указан для: **ВП** (Крашенинников, 1935: 385; Косенко, 1970: 529); **ЗК**: (Гроссгейм, 1949: 623), Бело-Лаб. (Галушко, 1978: 157), В. Куб. (Воробьева, Кононов, 1991: 37); **ЦЗ** (Гроссгейм, 1949: 623); **ВЗ**; **ЮЗ** (Крашенинников, 1935: 385; Гроссгейм, 1940, карта № 188, он же, 1949: 623)

Юго-Зап. Азия (Турция: Карсская обл., Ольтинский р-н, гора Ай-Даг, пер. Чингиль к оз. Ван; Артвинский округ, пост Арсиянский, Гюмушкане, Клыч-Гедун).

Несмотря на то что Н. Альбов, описавший из Абхазии (гора Чедым) *O. schmalhauseni*, позднее признал его лишь разновидностью *O. balansae*, Крашенинников указывает его распространение как самостоятельного вида в ЗЗ, ВЗ, ЮЗ, а Гроссгейм (1940, карта № 193; 1949: 623) для ЗК, ВК, ЗЗ, ЦЗ, ЮЗЗ, ЮЗ, Т. Часть гербарного материала, по-видимому, относится к *O. sigmoideum*, а также к другим высокогорным видам.

14. (233). *O. sigmoideum* Freyn et Sint. 1896, Bull. Herb. Boiss. 4: 189; Агапова, Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 244. — *O. nanum* auct. non Sibth. et Sm.: Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 220; Липский, 1899, Фл. Кавк.: 465; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 129.

Описан из северо-восточной Турции. Тур у s: «Armenia turcica. Gümüşkhane, in pascuis subalpinis. 5.1894. P. E. Sintenis 5436». (G, isotypus — LE!).

ЗЗ: Инг.-Рион. (Мамисонский пер.); ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Лори; ВЗ: Мург.-Муровд. (Иджеван); ЮЗЗ: Месх., Джав.-В. Ах., Араг.; ЮЗ; Т (Ярдымлинский р-н, гора Узун-баши).

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Иран).

Вид, описанный Шпета (Speta, 1990, Bot. Jahrb. 112, 1: 36) из Грузии — *O. ocellatum* Speta (Тур у s: «UDSSR, Georgien (Grusinische SSR), Grusinische Heerstrasse, Kreuzpass, zwischen Mleta und Kobi, ca. 3000 m, R. Schlamm s.n. cult. Kulm, 2. VI. 1988, 17. IV. 1989, 29. V. 1989 (Sp.)» Linz — Грузия (Грузинская ССР), Военно-Грузинская дорога, Крестовый пер., между Млети и Коби, около 3000 м), судя по описанию, близок *O. sigmoideum* или является его синонимом. Общими являются следующие признаки: сросшиеся чешуи луковицы, листья с продольной белой полосой, высота растений, относительные размеры цветоножек и прицветников, преломленные при плодах цветоножки, 6-реберная коробочка, число хромосом.

15. (234). *O. sintenisii* Freyn, 1902, Bull. Herb. Boiss. 2, 2: 911. — *O. schischkinii* Krasch. 1935, Фл. СССР, 4: 743, 386; Исаев, 1952, Фл. Азерб. 2: 182. — *O. cydni* auct. non Schott et Kotschy: Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 229. — *O. exscapum* auct. non Ten. Гроссг. 1928, l. c.: 230. — *O. refractum* auct. non Waldst. et Kit.: Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 160; Гроссг. 1928, l. c.: 229.

Описан из северного Ирана. Тур у s: «Persia borealis: prov. Asterabad, Bender Ges: in pascuis et fruticetis, 11 III 1901, fl. № 1429a, P. Sintenis (typus ? isotypi — G, LD, LE!).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; ВЗ; Т.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

16. (235). *O. woronowii* Krasch. 1935, Фл. СССР, 4: 743, 384.

Описан из Западного Закавказья. Тур у s: «Абхазия, Цебельда, на полянах около Юрьевского, 5–18 IV 1902, цв. № 168, Ю. Воронов» (LE! cum isotypo).

ЗП; ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб. (Майкоп и др.); ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Адж. (Кобулет, Батуми).

Указан для ВП: В. Ставр. (Галушко, 1978:157; Иванов, 2001: 36); ЦК: В. Кум., В. Тер. (Галушко, 1978: 157); ВК (Гроссгейм, 1949: 624), Асо-Арг. (Галушко, 1978: 157); СЗЗ (Гроссгейм, 1940: 165, карта № 192; он же, 1949: 624; Зернов, 2002: 83); ЗЗ (Гроссгейм, 1940: 165, карта № 192).

Юго-Вост. Европа (Крым).

Д. И. Сосновский (1938, Зам. сист., геогр. раст. (Тбилиси), 2: 3) описал из Грузии *O. imereticum*: «Georgia, inter p. p. Motzameti et Zemo-Godogani, in silva, 25 IV 1928 L. Kemularia-Nathadze» (ТБИ!). Имеется несколько образцов в гербарии Института ботаники Грузии — ЗЗ: Рион.-Квир. (окр. Кутаиси, Цулукидзе, сел. Иваидиди). Отличается от типичного *O. woronowii* отогнутыми вниз при плодах цветоножками. Гроссгейм (1940: 165; 1949: 624) приводит этот таксон как разновидность *O. woronowii*.

17. (236). *O. amblyocarpum* Zahar. 1965, Rev. Roum. Biol. (Bot.) 10, 4: 290.

Описан из Западного Закавказья. Турус: «Caucasus, Batumi, leg. I. Todor» (IBTS; 2 isotypi — LE!).

ЗЗ: Абх. (Сухуми), Адж. (окр. Батуми, Чаква).

Эндемик.

18. (237). *O. navaschirii* Agarova, 1998, Новости сист. высш. раст. 31: 31; Агапова, Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 241. — *O. azerbaijanicum* Askerova et Garakhani, 2001, Бот. журн. 86, 10: 94. — *O. tenuifolium* auct. non Guss.: Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 230; он же, 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 165; Краш. 1935, Фл. СССР, 4: 383; Сосн. 1941, Фл. Грузии, 2: 501; Исаев, 1952, Фл. Азерб. 2: 179; Cullen, 1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 27, 3: 311. — *O. gussonei* auct. non Ten.: Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 624; Косенко, 1970, Определ. высш. раст. сев.-зап. Кавк. и Предкавказ.: 529; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 157. — *O. kochii* auct. non Parl.: Новосад, 1992, Флора Керченско-Таманского региона: 252; Иванов, 2001, Конспект флоры Ставрополя: 36; Зернов, 2002, Определ. сосуд. раст. Рос. Причерноморья: 83.

Описан из Южного Закавказья. Турус: «Армянская ССР, между сел. Анипемза и Харьков, горная степь, 14. V. 1966, цв. Н. Агапова» (ERE N 144663, isotypus LE!).

ЗП; ВП; ЦК; ВК: Ман.-Самур.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Ширв., Н. Кур., Караб.; ЮЗЗ: Араг.; ЮЗ.

Указан для Т (Гроссгейм, 1940: 165, sub nom. *O. tenuifolium*, карта № 191; он же, 1949: 624, sub nom. *O. gussonei*).

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия (Турция: Карсская обл., Кагызман, дол. р. Аракс близ Ани; сев. Иран: Сеидходжи и Хой).

Таксономическое положение, кариология и отличия *O. navaschirii* от европейских (не встречающихся на Кавказе) видов *O. gussonei* Ten., *O. collinum* Guss., *O. kochii* Parl. рассмотрены ранее (Агапова, 1998).

Р. А. Аскерова и П. Х. Гарахани описали из Азербайджана *O. azerbaijanicum*: «Азербайджан, Нухинский р-н, на пастбище Дашлы-Бара, 20. V. 1928, В. Джебейн» (typus ВАК, isotypus LE!). Приводятся еще два гербарных образца из р-на Гянджи (Кировабад) (ВАК). Изотип, хранящийся в LE, не отличается от *O. navaschirii* Agarova.

2. (45). *Scilla* L.*

— gen. *Fessia* Speta, 1998. — gen. *Othocallis* Salisb. 1866

Sect. 1. *Scilla*

— sect. *Scilla* p. p. quoad pl. *S. bifolia* L. Мордак, 1979, Фл. Европ. части СССР, 4: 242; gen. *Scilla* s. str. excl. gen. *Chionodoxa* Boiss. — Speta, 1998. Phytion, 38, 1: 121.

1. (238). *S. bifolia* L. 1753, Sp. Pl. 1: 309; Мордак, 1966, Список раст. Герб. Фл. СССР, 16: 51, № 4506; она же, 1971, Бот. журн. 56, 10: 1448; Mordak, 1984, Fl. Turk.: 8: 216; Speta, 1980, Naturk. Jahrb. Stadt Linz, 25: 41. — *S. nivalis* Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. ser. 1, 5: 63; Гроссг. 1935, Фл. СССР, 4: 374; он же, 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 156; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 621; Манден. 1941, Фл. Груз. 2: 497; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 156; Speta, 1980, l. c.: 59; Колак. 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 282; Дмитриева, 1990, Определ. раст. Адж. изд. 2, 2: 144.

Описан по материалам из Франции и Германии: «...in Gallia, Germania» (Hb. Linn. 429/526!).

*Е. В. Мордак