

отметила, что в альпийском поясе Армении встречаются экземпляры с листочками околоцветника интенсивно синими по центру и бледными по краям, они габитуально резко отличаются от типичной *S. armena*. F. Speta (1980: taf. 8) приводит из разных точек Турции образцы растений подобной окраски. Бледноокрашенные формы *S. armena*, собранные в сев.-вост. Турции в р-не Гюмюшане (Speta, 1980: 105, taf. 7), как он полагал, являются переходными от обычной *S. armena* к *S. monanthos*. В указанном районе, следует заметить, ареалы этих видов перекрываются.

9. (246). ***S. otschiauriae*** Mordak, 1968, Новости сист. высш. раст.: 60; она же, 2002, Список раст. Герб. фл. Рос. и сопред. гос. 29: 53 № 7552; Speta, 1980, Naturk. Jahrb. Stadt Linz, 25: 94. — *S. siberica* subsp. *otschiauriae* (Mordak) Mordak, 1971, Бот. журн. 56, 10: 1451, «*sibirica*». — *Othocallis otschiauriae* (Mordak) Speta, 1998, Phytion, 38, 1: 112.

Описан из Восточной Грузии (Кахетии). Тур у s: «Закавказье, Восточная Грузия, окр. г. Кварели, ущелье р. Инцоба, разреженный грабово-буковый лес, около 1000 м н. у. м. 28 IV 1967. Е. В. Мордак» (LE!, isotyp! — (2) LE, BM, H, K, P).

ВЗ: Алаз.-Агрич. (Кахетия, ущелья рек Стори, Лопота, Инцоба и Дуруджи, при-токов Алазани).

Эндемик.

Кавказский вид, у которого как и у *S. armena*, признак 1(2)-цветковости выдержан хорошо.

3. (46). **Prospero** Salisb.*

1. (247). ***P. autumnale*** (L.) Speta, 1982, Veröff. Intern. Clusius-Forsch. Güssing 5: 4; id. 1998, Phytion, 38, 1: 116; Мордак, Абдуллаева, 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 25; Баранова, Мордак, 2004, Бот. журн. 89, 7: 1166. — *Scilla autumnalis* L. 1753, Sp. Pl. 1: 309; Гроссг. 1935, Фл. СССР, 4: 373; он же, 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 156; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 621; Манден. 1941, Фл. Груз. 2: 497; Ахунд. 1952, Фл. Азерб. 2: 172; Мордак, 1971, Бот. журн. 56, 10: 1455; Mordak, 1984, Fl. Turk. 8: 223; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 156; Wendelbo, 1985, Fl. Iraq, 8: 103; Колак. 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 281.

Описан по материалам из Европы: «... in Hispania, Gallia, Verona».

ЗП: Аз.-Куб.; ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; СЗЗ; ЗЗ: Абх.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Ширв.; Т.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Палестина, сев. Ирак).

4. (47). **Puschkinia** Adams*

1. (248). ***P. scilloides*** Adams, 1805, Nova Acta Acad. Sci. Petropol. 14: 164, tab. 13; Мордак, Абдуллаева, 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 26; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 248; Мордак, 2003, Новости сист. высш. раст. 35: 70. — *P. hyacinthoides* Baker, 1871, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 11: 435; Лозинск. 1935, Фл. СССР, 4: 394; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 167; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 624; Прил. 1952, Фл. Азерб. 2: 182; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. Рос. и сопр. гос.: 529.

Описан по гербарным материалам из северо-восточной Турции и Армении (гора Арарат, ущелья рек Дебет и Акстеф): «... in jugis subalpinis montis Ararat, circa metallifodinas argenteas, ad fl. Debeda et Achstapha nec non in cacumine monticuli Garvasin». Lectotypus (Мордак, 2003: 70): «Ex Caucaso iberico. Comm. Adam» (LE!).

*Е. В. Мордак