

отметила, что в альпийском поясе Армении встречаются экземпляры с листочками околоцветника интенсивно синими по центру и бледными по краям, они габитуально резко отличаются от типичной *S. armena*. F. Speta (1980: taf. 8) приводит из разных точек Турции образцы растений подобной окраски. Бледноокрашенные формы *S. armena*, собранные в сев.-вост. Турции в р-не Гюмюшане (Speta, 1980: 105, taf. 7), как он полагал, являются переходными от обычной *S. armena* к *S. monanthos*. В указанном районе, следует заметить, ареалы этих видов перекрываются.

9. (246). *S. otschiauriae* Mordak, 1968, Новости сист. высш. раст.: 60; она же, 2002, Список раст. Герб. фл. Рос. и сопред. гос. 29: 53 № 7552; Speta, 1980, Naturk. Jahrb. Stadt Linz, 25: 94. — *S. siberica* subsp. *otschiauriae* (Mordak) Mordak, 1971, Бот. журн. 56, 10: 1451, «*sibirica*». — *Othocallis otschiauriae* (Mordak) Speta, 1998, Phytion, 38, 1: 112.

Описан из Восточной Грузии (Кахетии). Тур у s: «Закавказье, Восточная Грузия, окр. г. Кварели, ущелье р. Инцоба, разреженный грабово-буковый лес, около 1000 м н. у. м. 28 IV 1967. Е. В. Мордак» (LE!, isotypі — (2) LE, BM, H, K, P).

ВЗ: Алаз.-Агрич. (Кахетия, ущелья рек Стори, Лопота, Инцоба и Дуруджи, притоков Алазани).

Эндемик.

Кавказский вид, у которого как и у *S. armena*, признак 1(2)-цветковости выдержан хорошо.

### 3. (46). *Prospero* Salisb.\*

1. (247). *P. autumnale* (L.) Speta, 1982, Veröff. Intern. Clusius-Forsch. Güssing 5: 4; id. 1998, Phytion, 38, 1: 116; Мордак, Абдуллаева, 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 25; Баранова, Мордак, 2004, Бот. журн. 89, 7: 1166. — *Scilla autumnalis* L. 1753, Sp. Pl. 1: 309; Гроссг. 1935, Фл. СССР, 4: 373; он же, 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 156; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 621; Манден. 1941, Фл. Груз. 2: 497; Ахунд. 1952, Фл. Азерб. 2: 172; Мордак, 1971, Бот. журн. 56, 10: 1455; Mordak, 1984, Fl. Turk. 8: 223; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 156; Wendelbo, 1985, Fl. Iraq, 8: 103; Колак. 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 281.

Описан по материалам из Европы: «... in Hispania, Gallia, Verona».

ЗП: Аз.-Куб.; ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; СЗЗ; ЗЗ: Абх.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Ширв.; Т.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Палестина, сев. Ирак).

### 4. (47). *Puschkinia* Adams\*

1. (248). *P. scilloides* Adams, 1805, Nova Acta Acad. Sci. Petropol. 14: 164, tab. 13; Мордак, Абдуллаева, 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 26; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 248; Мордак, 2003, Новости сист. высш. раст. 35: 70. — *P. hyacinthoides* Baker, 1871, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 11: 435; Лозинск. 1935, Фл. СССР, 4: 394; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 167; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 624; Прил. 1952, Фл. Азерб. 2: 182; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. Рос. и сопр. гос.: 529.

Описан по гербарным материалам из северо-восточной Турции и Армении (гора Арарат, ущелья рек Дебет и Акстеф): «... in jugis subalpinis montis Ararat, circa metallifodinas argenteas, ad fl. Debeda et Achstapha nec non in cacumine monticuli Garvasin». Lectotypus (Мордак, 2003: 70): «Ex Caucaso iberico. Comm. Adam» (LE!).

\* Е. В. Мордак

**ЦК; ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Абх. (Ачха, ТВИ!), Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Ширв., Караб., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ахур., Араг.; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур. (Раджи, 1981: 30).

Юго-Зап. Азия (юго-вост. Турция, Сирия, Ливан, сев. Ирак, сев.-зап. Иран).

Во «Флоре Абхазии» (Колаковский, 1986, т. 4) вид не приводится. На протяжении всего ареала вида наблюдается изменчивость таких признаков, как число цветков, их размеры и окраска, а также форма коронки околоцветника.

## 5. (48). *Hyacinthella* Schur\*

### Sect. 1. *Atropatana* (Mordak) K. M. Perss. et Wendelbo

1. (249). **Н. atropatana** (Grossh.) Mordak et Zakharyeva, 1981, in K. M. Perss, Wendelbo, *Candollea*, 36, 2: 539; Мордак, Захарьева, Баранова, 1989, *Новости сист. высш. раст.* 26: 45; Таманян, 2001, *Фл. Арм.* 10: 249; Мордак, 2003, *Новости сист. высш. раст.* 35: 69. — *Scilla atropatana* Grossh. 1935, *Фл. СССР*, 4: 740, 372; Гроссг. 1940, *Фл. Кавк. изд. 2*, 2: 155; он же, 1949, *Опред. раст. Кавк.:* 621; Ахунд. 1952, *Фл. Азерб.* 2: 172; Габриэлян, 1961, *Изв. АН АрмССР*, 14, 6: 91; Мордак, 1971, *Бот. журн.* 56, 10: 1457.

Описан из Нахичеванской АССР. *Турпу:* «Transcaucasia, Nachrespublica, prope st. viae-ferr. Dzulfu, in lapidosis. 25 IV 1933, fr. T. Heideman et L. Prilipko» (BAK! *изотурпу* — LE!).

**ЮЗ:** Нах., Мерг.-Зан. (Мерг.).

Эндемик.

## 6. (49). *Bellevalia* Lapeyr.\*

### Sect. 1. *Nutantes* Feinbrun

#### Subsect. *Coloratae* Feinbrun

1. (250). **В. macrobotrys** Boiss. 1853, *Diagn. Pl. Or. Nov. ser.* 1, 13: 37; Wendelbo, 1984, *Fl. Turk.* 8: 266; id. 1985, *Fl. Iraq.* 8: 116; id. 1990, in *Rech. f. Fl. Iran.* 165: 152; Мордак, 2003, *Бот. журн.* 88, 3: 105. — *B. zygomorpha* Woronow, 1927, *Изв. Главн. бот. сада СССР*, 26, 6: 618; Лозинск. 1935, *Фл. СССР*, 4: 398; Гроссг. 1940, *Фл. Кавк., изд. 2*, 2: 173; он же, 1949, *Опред. раст. Кавк.:* 624; Исаев, 1952, *Фл. Азерб.* 2: 186; Шхиян, Нерсесян, 2001, *Фл. Арм.* 10: 279.

Описан из Палестины: «... in arvis Palaestinae calidioris in regione Amalecitarum ad meridiem urbis Gaza sita, inter Ramla et Hierosolymam». *Турпу:* «Palaestina ad meridiem urbis Gaza inter Ramla et Hierosolymam. E. Boissier» (G — BOIS) (fide Wendelbo, 1990: 152).

**ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **Т.**

Указан для **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1940: 173, карта 200; Исаев, 1952: 186), Мерг.-Зан. (Гроссгейм, 1940: 173, карта 200).

Юго-Зап. Азия (южн. Турция, Сирия, Палестина, Ирак, зап. и южн. Иран); Сев. Африка (Египет).

2. (251). **В. fominii** Woronow, 1927, *Изв. Главн. бот. сада СССР*, 26, 6: 617; Wendelbo, 1984, *Fl. Turk.* 8: 267; id. 1990, in *Rech. f. Fl. Iran.* 165: 153; Шхиян, Нерсесян, 2001, *Фл. Арм.* 10: 276; Мордак, 2003, *Бот. журн.* 88, 3: 106.

\*Е. В. Мордак (Мордак, 2003)