

Lindl. и *N. dioscoridis* внутренние лепестки с одной, очень четко выраженной срединной жилкой, образующей с наружной стороны киль, что хорошо видно на многочисленных рисунках и фотографиях этих видов. У *N. tripedale* киль на наружной стороне лепестка не выражен, но боковые жилки, которые имеются на внутренних и наружных листочках околоцветника, очень явственные, контрастной ярко-розовой, иногда зеленоватой окраски. Это хорошо видно на гербарных образцах и на рисунках (Гроссгейм, 1940; Wendelbo, 1971, 1985; Persson, Wendelbo, 1979). *N. tripedale* отличается от *N. dioscoridis* также более узким ноготком — 2–3 мм, а не 3–4 мм дл., и менее крупным диском. Именно эти признаки, характеризующие *N. tripedale*, очень хорошо видны на рисунке, представленном Л. И. Прилипо как *N. dioscoridis*, поэтому найденное им растение с уверенностью можно отнести к *N. tripedale*, следовательно, речь идет не о новом виде для флоры Кавказа, а о новом местонахождении на Кавказе *N. tripedale*, которое дополняет его ареал в восточной части Кавказа, выявленный в результате флористических исследований П. Л. Львова (1961, 1980, 1988) и А. Раджи (1981).

Фам. 167. Amaryllidaceae J. St.-Hil.*

1. (53). *Pancratium* L.

1. (320). *P. maritimum* L. 1753, Sp. Pl.: 291; R. R. Mill, 1984, Fl. Turk. 8: 380.

Описан по материалам из Испании и Франции.

ЗЗ: Туап.-Адл. (район Адлера), Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж. Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

2. (54). *Sternbergia* Waldst. et Kit.

Sect. 1. *Sternbergia*

1. (321). *S. colchiciflora* Waldst. et Kit. 1803–1804, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 2: 172, tab. 159; Горшк. 1935, Фл. СССР, 4: 486; Кем.-Нат. 1941, Фл. Груз. 2: 529; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 172; В. Mathew, 1984, Fl. Turk. 8: 364; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 353. — *S. alexandrae* Sosn. 1936, Тр. Бот. инст. Азерб. фил. АН СССР, 2: 269; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 195; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 631; Рзазаде, 1952, Фл. Азерб. 2: 206. — *S. colchiciflora* Waldst. et Kit. var. *alexandrae* (Sosn.) Artjush. 1970, Амарил. СССР: 95.

Описан из Венгрии.

ЗП: З. Ставр. (Калужный); ВП: Тер.-Сулак. (Новогеоргиевск); ЦК: В. Кум. (гора Бештау); СЗЗ: Анап.-Гел. (Геленджик); ЦЗ: Триал.-Н. Карт. (Elisabeththal); ВЗ: Иорск.-Шек. (Царские колодцы, Карамарьян).

Указан для ВК: Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1940: 195, sub nom. *S. alexandrae*; Галушко, 1978: 172); ЦЗ: Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси) (Кемулярия-Натадзе, 1941: 529); ВЗ: Ширв. (Шемаха) (Рзазаде, 1952: 206, sub nom. *S. alexandrae*), Мург.-Муровд. (Иджеванский р-н, с. Тала) (Габриэлян, 2001: 353); ЮЗ: Ерев. (между селами Вардашен и Шорахбюр, окр. с. Джрвеж) (Габриэлян, 2001: 353).

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия).

Sect. 2. *Oporanthus* (Herb.) Pax

2. (322). *S. lutea* (L.) Ker-Gawl. ex Spreng. 1825, Syst. Veg. 2: 57; В. Mathew, 1984, Fl. Turk. 8: 361; Wendelbo, 1985, Fl. Iraq, 8: 221. — *Amaryllis lutea* L. 1753, Sp. Pl.: 292.

Описан по материалам из Испании, Италии и Греции.

*З. Т. Аргюшенко, Е. В. Мордак