

Lindl. и *N. dioscoridis* внутренние лепестки с одной, очень четко выраженной срединной жилкой, образующей с наружной стороны киль, что хорошо видно на многочисленных рисунках и фотографиях этих видов. У *N. tripedale* киль на наружной стороне лепестка не выражен, но боковые жилки, которые имеются на внутренних и наружных листочках околоцветника, очень явственные, контрастной ярко-розовой, иногда зеленоватой окраски. Это хорошо видно на гербарных образцах и на рисунках (Гроссгейм, 1940; Wendelbo, 1971, 1985; Persson, Wendelbo, 1979). *N. tripedale* отличается от *N. dioscoridis* также более узким ноготком — 2–3 мм, а не 3–4 мм дл., и менее крупным диском. Именно эти признаки, характеризующие *N. tripedale*, очень хорошо видны на рисунке, представленном Л. И. Прилипо как *N. dioscoridis*, поэтому найденное им растение с уверенностью можно отнести к *N. tripedale*, следовательно, речь идет не о новом виде для флоры Кавказа, а о новом местонахождении на Кавказе *N. tripedale*, которое дополняет его ареал в восточной части Кавказа, выявленный в результате флористических исследований П. Л. Львова (1961, 1980, 1988) и А. Раджи (1981).

Фам. 167. Amaryllidaceae J. St.-Hil.*

1. (53). *Pancratium* L.

1. (320). *P. maritimum* L. 1753, Sp. Pl.: 291; R. R. Mill, 1984, Fl. Turk. 8: 380.

Описан по материалам из Испании и Франции.

ЗЗ: Туап.-Адл. (район Адлера), Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж. Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

2. (54). *Sternbergia* Waldst. et Kit.

Sect. 1. *Sternbergia*

1. (321). *S. colchiciflora* Waldst. et Kit. 1803–1804, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 2: 172, tab. 159; Горшк. 1935, Фл. СССР, 4: 486; Кем.-Нат. 1941, Фл. Груз. 2: 529; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 172; В. Mathew, 1984, Fl. Turk. 8: 364; Габриэлян, 2001, Фл. Арм. 10: 353. — *S. alexandrae* Sosn. 1936, Тр. Бот. инст. Азерб. фил. АН СССР, 2: 269; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 195; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 631; Рзазаде, 1952, Фл. Азерб. 2: 206. — *S. colchiciflora* Waldst. et Kit. var. *alexandrae* (Sosn.) Artjush. 1970, Амарил. СССР: 95.

Описан из Венгрии.

ЗП: З. Ставр. (Калужный); **ВП:** Тер.-Сулак. (Новогеоргиевск); **ЦК:** В. Кум. (гора Бештау); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Геленджик); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Elisabeththal); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Царские колодцы, Карамарьян).

Указан для **ВК:** Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1940: 195, sub nom. *S. alexandrae*; Галушко, 1978: 172); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси) (Кемулярия-Натадзе, 1941: 529); **ВЗ:** Ширв. (Шемаха) (Рзазаде, 1952: 206, sub nom. *S. alexandrae*), Мург.-Муровд. (Иджеванский р-н, с. Тала) (Габриэлян, 2001: 353); **ЮЗ:** Ерев. (между селами Вардашен и Шорахбюр, окр. с. Джрвеж) (Габриэлян, 2001: 353).

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия).

Sect. 2. *Oporanthus* (Herb.) Pax

2. (322). *S. lutea* (L.) Ker-Gawl. ex Spreng. 1825, Syst. Veg. 2: 57; В. Mathew, 1984, Fl. Turk. 8: 361; Wendelbo, 1985, Fl. Iraq, 8: 221. — *Amaryllis lutea* L. 1753, Sp. Pl.: 292.

Описан по материалам из Испании, Италии и Греции.

*З. Т. Аргюшенко, Е. В. Мордак

Указан для **ВК**: Кубин. (устье Самура, Хачмас) (Гроссгейм, 1940: 195, Рзазаде, 1952: 207); **Т** (Ахсагляр) (Гроссгейм, 1940: 195, Рзазаде, 1952: 207).

Средиз.; Юго-Зап. (Ливан, Турция, Ирак, сев. Иран), Ср. (Туркмения) Азия.

3. (323). *S. fischeriana* (Herb.) M. Roem. 1847, *Amaryll.* 4 (*Ensatae*): 46; Филиппов, 1916, *Мат. Фл. Кавк.* 2, 5: 11; В. Mathew, 1984, *Fl. Turk.* 8: 362; Wendelbo, 1985, *Fl. Iraq*, 8: 223; Габриэлян, 2001, *Фл. Арм.* 10: 350. — *Oporanthus fischerianus* Herb. 1837, *Amaryll.*: 412.

Описан из Азербайджана (Карабах). *Турп* *us*: «In collibus graminosis circa castellum Agh-oglan. Prov. Karabagh. 26 Febr. 1828. Szovits» (К, isotypi — 5 LE!).

ВЗ: Шир. (Шемаха), Н. Кур. (Геок-Тапа, Буджах), Караб.; **ЮЗ**: Занг.

Указан для **ЮЗ**: Мегр.-Зан. (Габриэлян и др., 1984: 247); **Т** (Гроссгейм, 1940: 195, Рзазаде, 1952: 206).

Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ирак, Иран), Ср. (Памиро-Алай) Азия.

3. (55). *Leucojum* L.

1. (324). *L. aestivum* L. 1759, *Syst. Nat.* ed. 10, 2: 975; Wendelbo, 1970, in *Rech. f. Fl. Iran.* 67: 6; R. R. Mill, 1984, *Fl. Turk.* 8: 364.

Описан из Южной Европы.

ЗП; **ЗК**: Адаг.-Пшиш.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**.

Указан для **СЗЗ**: Пшад.-Джубг. (Зернов, 2002: 85).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (сев. Турция, сев.-зап. Иран).

4. (56). *Galanthus* L.

Ser. 1. *Galanthus*

1. (325). *G. plicatus* Bieb. 1819, *Fl. Taur.-Cauc.* 3: 255. — *G. nivalis* auct. non L.: Bieb. 1808, *Fl. Taur.-Cauc.* 1: 259. — *G. plicatus* subsp. *plicatus*, A. P. Davis, 1999, *The genus Galanthus*: 111.

Описан по материалам из Крыма. *Турп* *us*: «... ex Tauriae» (Herb. Bieb. — LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел. (Новороссийский район, гора Глебовка, 19 III 1997, А. Зернов; там же, 3.5 км к СВ от пос. Южная Озерейка, верховье Глубокой щели, 500 м н. у. м. ясеньевый лес. 7 IV 2001. А. Серегин).

Юго-Вост. Европа (Румыния, Крым); Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Турция).

Ser. 2. *Latifolii* Kem.-Nath.

Subser. 1. *Glaucifolii* (Kem.-Nath.) A. P. Davis

2. (326). *G. alpinus* Sosn. 1911, *Вестн. Тифл. бот. сада* 19: 26; Лозинск. 1935, *Фл. СССР*, 4: 479; Гроссг. 1940, *Фл. Кавк. изд. 2*, 2: 193; он же, 1949, *Опред. раст. Кавк.*: 630; Kem.-Nath. 1941, *Фл. Груз.* 2: 526; Артюш. 1970, *Амарил. СССР*: 79; Дмитриева, 1990, *Опред. раст. Адж. изд. 2*, 2: 151; A. P. Davis, Mordak, Juri, 1996, *Kew Bull.* 51, 4: 746; A. P. Davis, 1999, *The genus Galanthus*: 123; Габриэлян, 2001, *Фл. Арм.* 10: 355; Габриэлян, Назарова, 2002, *Фл., растит., раст. рес. Армении*, 14: 49.