

Описан из Северной Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для **ВЗ:** Караб. (Прилипко, 1952: 200); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Манденова, 1941: 519; Таманян, 2001: 365); **ЮЗ:** Ерев., Занг. (Таманян, 2001: 365).

Европа; Юго-Зап. (сев.-вост. Турция, вост. Афганистан, Пакистан), Вост. Азия.

2. (58). *Maianthemum* Wigg.*

1. (340). *M. bifolium* (L.) F. W. Schmidt, 1794, Fl. Böem. 4: 55. — *Convallaria bifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 316.

Описан из Северной Европы.

ВК: В. Сулак. (Тляратинский р-н, с. Суэтьль); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (между Душети и Ананури).

Указан для **ЦК:** В. Кум. (окр. Железноводска, Галушко, 1978: 169).

Атл., Сев., Центр., Вост., Юго-Вост. Европа; Сев., Вост. Азия.

3. (59). *Convallaria* L.*

1. (341). *C. majalis* L. 1753, Sp. Pl.: 314; Косенко, 1970, Опред. высш. раст. сев.-зап. Кавк. и Предкавказ.: 532; Мордак, 1993, Список раст. Герб. фл. России и сопред. гос. 28: 22, № 7200; R. R. Mill, 1984, Fl. Turk. 8: 84. — *C. transcaucasica* Utkin ex Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 242; он же, 1929, Журн. Рус. бот. об-ва 14: 187; он же, 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 190; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 629; Тер.-Хач. 1941, Фл. Груз. 2: 521; Рзазаде, 1952, Фл. Азерб. 2: 202; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 170; Колак., 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 267. — *C. majalis* L. var. *transcaucasica* (Utkin ex Grossh.) Knorr. 1935, Фл. СССР, 4: 468. — *C. majalis* L. subsp. *transcaucasica* (Utkin ex Grossh.) Bordz. 1950, Фл. УРСР, 3: 262; Дмитриева, 1990, Опред. раст. Адж. изд. 2, 2: 149.

Описан из Северной Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 170); **СЗЗ** (Зернов, 2002: 84); **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1990: 149); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1940: 190, карта 220).

Европа; Средиз.; Сев. (Прибайкалье), Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Вост. Азия; Сев. Америка.

Fam. 169. *Ruscaceae* M. Roem.*

1. (60). *Danaë* Medic.

1. (342). *D. racemosa* (L.) Moench, 1794, Method. 170; P. H. Davis, 1984, Fl. Turk. 8: 75; Wendelbo, 1990, in Rech. f. Fl. Iran. 165: 177. — *Ruscus racemosus* L. 1753, Sp. Pl.: 1041.

*Е. В. Мордак

Классическое местонахождение не указано. *Turpus* (BM—Hb. Cliff.) (fide P. H. Davis, 1984: 75).

Т.

Юго-Зап. Азия (юго-вост. Турция, зап. Сирия, сев. Иран).

2. (61). *Ruscus* L.

Sect. 1. *Ruscus*

— ser. *Ramosae* P. F. Yeo

1. (343). *R. aculeatus* L. 1753, Sp. Pl.: 1041; P. F. Yeo, 1980, Fl. Europ. 5: 73; Колак. 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 307. — *R. aculeatus* var. *angustifolius* Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 341; P. H. Davis, 1984, Fl. Turk. 8: 73. — *R. ponticus* Woronow, 1916, in Sched. Herb. Fl. Sauc., Fasc. 7: 50, N 309, in adnot.; Черняк. 1935, Фл. СССР, 4: 444; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 185; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 628; Манден. 1941, Фл. Груз. 2: 518; Косенко, 1970, Определ. высш. раст. сев.-зап. Кавк. и Предкавказ.: 532; Дмитриева, 1990, Определ. раст. Адж. изд. 2, 2: 148.

Описан по материалам из Франции и Италии.

СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Сирия).

В обстоятельной работе Л. И. Абрамовой (1993) приводятся доводы в пользу самостоятельности вида *Ruscus ponticus*.

2. (344). *R. hyrcanus* Woronow, 1907, Вестн. Тифл. бот. сада, 7: 33; Wendelbo, 1990, in Rech. f. Fl. Iran. 165: 178.

Описан из Талыша и сев. Ирана: «...in sylvis prov. Talysch et Persiae borealis provinc. mari Caspio adjacentium (Ghilan et Masandaran)». Lectotypus (Папава, 1954: 73, «cotypus»): «Gub. Baku. Talysch. Inter Navsavuja et Hirdoni. In planitie ad fl. Navza-arü. 0–100', 12 VIII 1897, leg. Alexeenko». (TGM, isolectotypus — LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

Гербарный образец: «Крым, Ялта, 1895, Б. Левандовский» — (LE!) имеет сомнительную этикетку.

Sect. 2. *Platyrruscus* (A. Khokhr. et V. N. Tichom.) A. Zernov

2004, Новости сист. высш. раст. 36: 223. — *Platyrruscus* A. Khokhr. et V. N. Tichom. 1993, Бюл. Моск. об-ва исп. прир. отд. биол. 98, 4: 92. — *Ruscus* L. ser. *Simplices* P. F. Yeo, 1968, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28: 250.

3. (345). *R. colchicus* P. F. Yeo, 1966, Feddes Repert. 73, 1: 18; id. 1968, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28, 3: 250; P. H. Davis, 1984, Fl. Turk. 8: 74; Колак. 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 307; Дмитриева, 1990, Определ. раст. Адж. изд. 2, 2: 148. — *R. hypophyllum* aust. non L.: Черняк. 1935, Фл. СССР, 4: 444; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 185; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 628; Манден. 1941, Фл. Груз. 2: 518; Косенко, 1970, Определ. высш. раст. сев.-зап. Кавк. и Предкавказ.: 532; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 169. — *Platyrruscus colchicus* (P. F. Yeo) A. Khokhr., V. N. Tichom. 1993, Бюл. Моск. об-ва исп. прир. отд. биол. 98, 4: 92.

Описан из Западного Закавказья. *Turpus*: «Черноморский округ. Район Сочи-ский. Лесничество Дагомыское. Дача Головинская. Самшитник на правом берегу р. Бзыч. 27 V 1930. Н. Брызжев» (LE!).