

Классическое местонахождение не указано. *Turpus* (BM—Hb. Cliff.) (fide P. H. Davis, 1984: 75).

Т.

Юго-Зап. Азия (юго-вост. Турция, зап. Сирия, сев. Иран).

2. (61). *Ruscus* L.

Sect. 1. *Ruscus*

— ser. *Ramosae* P. F. Yeo

1. (343). *R. aculeatus* L. 1753, Sp. Pl.: 1041; P. F. Yeo, 1980, Fl. Europ. 5: 73; Колак. 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 307. — *R. aculeatus* var. *angustifolius* Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 341; P. H. Davis, 1984, Fl. Turk. 8: 73. — *R. ponticus* Woronow, 1916, in Sched. Herb. Fl. Sauc., Fasc. 7: 50, N 309, in adnot.; Черняк. 1935, Фл. СССР, 4: 444; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 185; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 628; Манден. 1941, Фл. Груз. 2: 518; Косенко, 1970, Определ. высш. раст. сев.-зап. Кавк. и Предкавказ.: 532; Дмитриева, 1990, Определ. раст. Адж. изд. 2, 2: 148.

Описан по материалам из Франции и Италии.

СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Сирия).

В обстоятельной работе Л. И. Абрамовой (1993) приводятся доводы в пользу самостоятельности вида *Ruscus ponticus*.

2. (344). *R. hyrcanus* Woronow, 1907, Вестн. Тифл. бот. сада, 7: 33; Wendelbo, 1990, in Rech. f. Fl. Iran. 165: 178.

Описан из Талыша и сев. Ирана: «...in sylvis prov. Talysch et Persiae borealis provinc. mari Caspio adjacentium (Ghilan et Masandaran)». Lectotypus (Папава, 1954: 73, «cotypus»): «Gub. Baku. Talysch. Inter Navsavuja et Hirdoni. In planitie ad fl. Navza-arü. 0–100', 12 VIII 1897, leg. Alexeenko». (TGM, isolectotypus — LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

Гербарный образец: «Крым, Ялта, 1895, Б. Левандовский» — (LE!) имеет сомнительную этикетку.

Sect. 2. *Platyruscus* (A. Khokhr. et V. N. Tichom.) A. Zernov

2004, Новости сист. высш. раст. 36: 223. — *Platyruscus* A. Khokhr. et V. N. Tichom. 1993, Бюл. Моск. об-ва исп. прир. отд. биол. 98, 4: 92. — *Ruscus* L. ser. *Simplices* P. F. Yeo, 1968, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28: 250.

3. (345). *R. colchicus* P. F. Yeo, 1966, Feddes Repert. 73, 1: 18; id. 1968, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28, 3: 250; P. H. Davis, 1984, Fl. Turk. 8: 74; Колак. 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 307; Дмитриева, 1990, Определ. раст. Адж. изд. 2, 2: 148. — *R. hypophyllum* aust. non L.: Черняк. 1935, Фл. СССР, 4: 444; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 185; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 628; Манден. 1941, Фл. Груз. 2: 518; Косенко, 1970, Определ. высш. раст. сев.-зап. Кавк. и Предкавказ.: 532; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 169. — *Platyruscus colchicus* (P. F. Yeo) A. Khokhr., V. N. Tichom. 1993, Бюл. Моск. об-ва исп. прир. отд. биол. 98, 4: 92.

Описан из Западного Закавказья. *Turpus*: «Черноморский округ. Район Сочи-ский. Лесничество Дагомыское. Дача Головинская. Самшитник на правом берегу р. Бзыч. 27 V 1930. Н. Брызжев» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.
Указан для **ЗК:** Адаг-Пишиш. (Галушко, 1978: 169).
Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Фам. 170. *Asparagaceae* Juss.*

1. (62). *Asparagus* L.

Sect. 1. *Archiasparagus* Pjin

1. (346). *A. verticillatus* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2, 1: 450; P. H. Davis, 1984, Fl. Turk. 8: 77; Browicz, 1990, in Rech. f. Fl. Iran. 165: 169; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 376.

Описан из Дагестана: «In Oriente, circa Derbentum Daghestan».

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Сосновский, 1941: 515).

Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

Sect. 2. *Asparagus*

2. (347). *A. officinalis* L. 1753, Sp. Pl.: 313; P. H. Davis, 1984, Fl. Turk. 8: 78; Browicz, 1990, in Rech. f. Fl. Iran. 165: 169; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 376. — *A. caspius* Schult. et Schult. f. 1829, in Roem. et Schult. Syst. Veg. 7, 1: 322; Ильин, 1935, Фл. СССР, 4: 440, cum auct. Hohen.; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 182, cum auct. Hohen.; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 627, cum auct. Hohen. — *A. polyphyllus* Stev. 1857, Bull. Soc. Nat. Mosc. 30, 3: 91; Ильин, 1935, цит. соч.: 441; Гроссг. 1940, цит. соч.: 182; он же, 1949, цит. соч.: 627. — *A. litoralis* Stev. 1857, l. c.: 92; Ильин, 1935, цит. соч.: 442; Гроссг. 1940, цит. соч.: 182; он же, 1949, цит. соч.: 627. — *A. buschii* N. Ivanova in sched.; Гроссг. 1949, цит. соч.: 627, descr. ross.

Описан из Европы.

ЗП; ВП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Исаев, 1952: 195).

Европа; Средиз.; Сев. (Зап. Сибирь), Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. (сев.-вост.) Азия. Культивируется как овощное растение.

3. (348). *A. persicus* Baker, 1875, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 14: 603; P. H. Davis, 1984, Fl. Turk. 8: 79; Browicz, 1990, in Rech. f. Fl. Iran. 165: 170; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 378. — *A. oligophyllus* Baker 1875, l. c.: 604; Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 628. — *A. pallasii* Misch. 1916, Вестн. Тифл. бот. сада 12, 1–2: 27; Гроссг. 1949, цит. соч.: 627. — *A. leptophyllus* Schischk. 1929, Изв. Томск. ун-та 81: 434; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 184; он же, 1949, цит. соч.: 628; Исаев, 1952, Фл. Азерб. 2: 196. — *A. scaber* auct. non Brign.: Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 198.

Описан из северного Ирана. Turp u s: «Persia borealis ad radices montis Demavend, prope pagum Ask. Kotschy, 365» (K, isotypi: E, G, LE!).

*К. Г. Таманян