

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.
Указан для **ЗК:** Адаг.-Пишиш. (Галушко, 1978: 169).
Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Фам. 170. *Asparagaceae* Juss.*

1. (62). *Asparagus* L.

Sect. 1. *Archiasparagus* Pjin

1. (346). *A. verticillatus* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2, 1: 450; P. H. Davis, 1984, Fl. Turk. 8: 77; Browicz, 1990, in Rech. f. Fl. Iran. 165: 169; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 376.

Описан из Дагестана: «In Oriente, circa Derbentum Daghestan».

ЗП; **ВП;** **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Сосновский, 1941: 515).

Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

Sect. 2. *Asparagus*

2. (347). *A. officinalis* L. 1753, Sp. Pl.: 313; P. H. Davis, 1984, Fl. Turk. 8: 78; Browicz, 1990, in Rech. f. Fl. Iran. 165: 169; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 376. — *A. caspius* Schult. et Schult. f. 1829, in Roem. et Schult. Syst. Veg. 7, 1: 322; Ильин, 1935, Фл. СССР, 4: 440, cum auct. Hohen.; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 182, cum auct. Hohen.; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 627, cum auct. Hohen. — *A. polyphyllus* Stev. 1857, Bull. Soc. Nat. Mosc. 30, 3: 91; Ильин, 1935, цит. соч.: 441; Гроссг. 1940, цит. соч.: 182; он же, 1949, цит. соч.: 627. — *A. litoralis* Stev. 1857, l. c.: 92; Ильин, 1935, цит. соч.: 442; Гроссг. 1940, цит. соч.: 182; он же, 1949, цит. соч.: 627. — *A. buschii* N. Ivanova in sched.; Гроссг. 1949, цит. соч.: 627, descr. ross.

Описан из Европы.

ЗП; **ВП;** **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Исаев, 1952: 195).

Европа; Средиз.; Сев. (Зап. Сибирь), Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. (сев.-вост.) Азия. Культивируется как овощное растение.

3. (348). *A. persicus* Baker, 1875, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 14: 603; P. H. Davis, 1984, Fl. Turk. 8: 79; Browicz, 1990, in Rech. f. Fl. Iran. 165: 170; Таманян, 2001, Фл. Арм. 10: 378. — *A. oligophyllus* Baker 1875, l. c.: 604; Гроссг. 1949, Определ. раст. Кавк.: 628. — *A. pallasii* Misch. 1916, Вестн. Тифл. бот. сада 12, 1–2: 27; Гроссг. 1949, цит. соч.: 627. — *A. leptophyllus* Schischk. 1929, Изв. Томск. ун-та 81: 434; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 184; он же, 1949, цит. соч.: 628; Исаев, 1952, Фл. Азерб. 2: 196. — *A. scaber* auct. non Brign.: Ledeb. 1853, Fl. Ross. 4: 198.

Описан из северного Ирана. Turpus: «Persia borealis ad radices montis Demavend, prope pagum Ask. Kotschy, 365» (K, isotypi: E, G, LE!).

*К. Г. Таманян

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан.

Указан для **ВП:** В. Ставр. (вост. окраина) (Иванов, 2001: 38).

Вост. Европа (Нижн.-Волж.); Сев. (на юге), Юго-Зап. (вост. Турция, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

4. (349). **A. breslerianus** Schult. et Schult. f. 1829, in Roem. et Schult. Syst. Veg. 7.1: 323; Миш. 1916, Вестн. Тифл. бот. сада, 12, 1-2: 33; Ильин, 1935, Фл. СССР, 4: 431, cum auct. Schult.; Цветкова, 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 288; Browicz, 1990, in Rech. f. Fl. Iran. 165: 171. — *A. triglochideus* Pall. 1808, nom. inval., in mss. — *A. verticillatus* var. *triphyllus* Bresl. 1826, Dissert.: N 27. — *A. maritimus* Pall. var. *breslerianus* (Schult. et Schult. f.) Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 337.

Locus classicus не указан. Тур у s: «*Rossia ... scripsit. Sokolow comes Pallassii*» (M, photo — ERE!).

ВП: Тер.-Кум.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ВЗ:** Ширв. (Апшерон); **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1940: 184).

Вост. Европа (Нижн.-Волж.); Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср., Вост. (сев.-зап. Китай) Азия.

Авторы вида ссылаются на диссертацию М. Бреслера (Bresl. 1826, op. cit.). Prof. H. Merxmüller любезно прислал нам из Мюнхена фотографию типа с цитированной выше этикеткой.

5. (350). **A. ledebourii** Misch. 1916, Вестн. Тифл. бот. сада, 12, 1-2: 30; Пазий, 1971, Опред. раст. Ср. Аз. 2: 117. — *A. persicus* auct. non Baker: Ильин, 1935, Фл. СССР, 4: 438, р. р.; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 184, р. р.

Описан из Азербайджана. Тур у s: «*In sabulosis maritimis prope Baku, 17 IV 1830 C. A. Meyer*» (LE!).

ВК: Ман.-Самур. (Дербент); **ВЗ:** Ширв. (Баку).

Ср. Азия.

Subclassis Commelinidae

Superordo Pontederianae

ORDO 14. PONTEDERIALES

Fam. 172. Pontederiaceae Kunth*

1. (63). Monochoria C. Presl

1. (351). **M. korsakowii** Regel et Maack, 1861, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys.-Math.), sér. 7, 4, 4: 155, tab. 12; Косенко, 1970, Опред. высш. раст. Сев.-Зап. Кавказа и Предкавказья: 516. — *M. vaginalis* (Burm. f.) C. Presl ex Kunth var. *korsakowii* (Regel et Maack) Solms, 1883, in A. DC. et C. DC. Mongr. Phan. 4: 523. — *Pontederia vaginalis* Burm. f. 1768, Fl. Indica : 80.

Описан из Южного Приморья (оз. Ханка).

ЗП: Аз.-Куб. (низовья Кубани, заносный, сорный на рисовых полях и заболоченных участках); **ЗК:** Адаг.-Пишиш. (Северский р-н Краснодарского края, заносный, вдоль лесных дорог).

*Т. Н. Попова