

**ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мерг.-Зан.

Указан для **ВП:** В. Ставр. (вост. окраина) (Иванов, 2001: 38).

Вост. Европа (Нижн.-Волж.); Сев. (на юге), Юго-Зап. (вост. Турция, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

4. (349). **A. breslerianus** Schult. et Schult. f. 1829, in Roem. et Schult. Syst. Veg. 7.1: 323; Миш. 1916, Вестн. Тифл. бот. сада, 12, 1-2: 33; Ильин, 1935, Фл. СССР, 4: 431, cum auct. Schult.; Цветкова, 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 288; Browicz, 1990, in Rech. f. Fl. Iran. 165: 171. — *A. triglochideus* Pall. 1808, nom. inval., in mss. — *A. verticillatus* var. *triphyllus* Bresl. 1826, Dissert.: N 27. — *A. maritimus* Pall. var. *breslerianus* (Schult. et Schult. f.) Boiss. 1882, Fl. Or. 5: 337.

Locus classicus не указан. Тур у s: «*Rossia ... scripsit. Sokolow comes Pallassii*» (M, photo — ERE!).

**ВП:** Тер.-Кум.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ВЗ:** Ширв. (Апшерон); **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1940: 184).

Вост. Европа (Нижн.-Волж.); Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср., Вост. (сев.-зап. Китай) Азия.

Авторы вида ссылаются на диссертацию М. Бреслера (Bresl. 1826, op. cit.). Prof. H. Merxmüller любезно прислал нам из Мюнхена фотографию типа с цитированной выше этикеткой.

5. (350). **A. ledebourii** Miscz. 1916, Вестн. Тифл. бот. сада, 12, 1-2: 30; Пазий, 1971, Опред. раст. Ср. Аз. 2: 117. — *A. persicus* auct. non Baker: Ильин, 1935, Фл. СССР, 4: 438, р. р.; Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 184, р. р.

Описан из Азербайджана. Тур у s: «*In sabulosis maritimis prope Baku, 17 IV 1830 C. A. Meyer*» (LE!).

**ВК:** Ман.-Самур. (Дербент); **ВЗ:** Ширв. (Баку).

Ср. Азия.

## Subclassis Commelinidae

### Superordo Pontederianae

#### ORDO 14. PONTEDERIALES

##### Fam. 172. Pontederiaceae Kunth\*

###### 1. (63). Monochoria C. Presl

1. (351). **M. korsakowii** Regel et Maack, 1861, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys.-Math.), sér. 7, 4, 4: 155, tab. 12; Косенко, 1970, Опред. высш. раст. Сев.-Зап. Кавказа и Предкавказья: 516. — *M. vaginalis* (Burm. f.) C. Presl ex Kunth var. *korsakowii* (Regel et Maack) Solms, 1883, in A. DC. et C. DC. Mongr. Phan. 4: 523. — *Pontederia vaginalis* Burm. f. 1768, Fl. Indica : 80.

Описан из Южного Приморья (оз. Ханка).

**ЗП:** Аз.-Куб. (низовья Кубани, заносный, сорный на рисовых полях и заболоченных участках); **ЗК:** Адаг.-Пишиш. (Северский р-н Краснодарского края, заносный, вдоль лесных дорог).

\*Т. Н. Попова

Вост. Азия (Дальний Восток России, Япония, Корея, Китай). Заносный в Вост. и Юго-Вост. Европе (Нижний Дон, Украина, Причерноморье: Херсонская обл.; Крым).

Для Восточной Европы и Западного Предкавказья впервые был указан И.С. Косенко (Косенко, Сапелкин, 1968; Косенко, 1970). В дальнейшем был обнаружен на Украине (Лактионов, 1972; Протопопова, 1979).

## Superordo Commelinanae

### ORDO 15. COMMELINALES MIRB.

#### Fam. 173. Commelinaceae Mirb.\*

##### 1. (64). *Commelina* L.

1. (352). *C. benghalensis* L. 1753, Sp. Pl.: 41, nom. cons.

Описан из Индии.

**ЗЗ:** Адж. (заносный).

Юго-Вост., Южн. Азия, Африка (заносный).

Указывался для Аджарии А.А. Гроссгеймом (1949: 667) как однолетний вид, но А.А. Дмитриевой (1960: 380) считался исчезнувшим и позднее (1990, 2: 192) не отмечен для этого региона. Возможно, эти указания относятся не к многолетнему *C. benghalensis*, а к однолетнему *C. diffusa* Burm f. 1768, Fl. Indica: 18 (см. Н. Дeyuan, R. A. De Filippis, 2000: 36), у которого трехгнездная коробочка, семена по два в каждом гнезде, черные, яйцевидно-шаровидные.

2. (353). *C. communis* L. 1753, Sp. Pl.: 40.

Описан из Америки: «America».

**ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум. (Кисловодск); **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Бакуриани);

**Т.**

Широко натурализовался. Адвентивное сорное растение.

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (Украина, центральные и южные области России) Европа (заносный); Юго-Зап. (Турция), Вост. (включая Дальний Восток России), Юго-Вост. Азия; Америка (интродуцирован).

##### 2. (65). *Tradescantia* L.

1. (354). *T. virginiana* L. 1753, Sp. Pl.: 288.

Описан из Северной Америки.

**ЦК:** В. Тер. (заносный); **ЗЗ:** Адж. (Кобулет, заносный).

Южн. Европа (широко культивируется, натурализовался); Сев. Америка (Восток США).

Большая часть культивируемых и соответственно натурализовавшихся растений, предположительно (Burges, 1980), гибридные.

2. (355). *T. fluminensis* Vell. 1825, Fl. Flum.: 140.

Описан из Южной Америки (Бразилии).

**ЗЗ:** Адж. (Батуми, широко натурализовался).

Атл. (юг), Южн. Европа; Средиз. (натурализовался); Южн. Америка (от юго-вост. Бразилии до Аргентины).

---

\*Т. Н. Попова