

Sect. 4. *Stygiopsis* Kuntze

—sect. *Terminiflora* Peterm. 1849, nom. illeg. — subgen. *Stygiopsis* (Gand. ex Post et Kuntze)
V. Krecz. et Gontsch.

26. (381). *J. triglumis* L. s. l., 1753, Sp. Pl.: 328. — *J. schischkinii* Kryl. et Sumn. 1928, Animad. Herb. Univ. Tomsk. 1: 7.

Описан из Скандинавии.

ЗК: Адаг.-Пшиш., Уруп.-Теб.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦК:** В. Кум., Малк.

Сев., Центр., Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. (Монголия) Азия.

Полиморфный вид. На Кавказе помимо типичной формы распространена var. *schischkinii* (Kryl. et Sumn.) V. Novikov (1979, Новости сист. высш. раст. 15: 88. — *J. schischkinii* Kryl. et Sumn. Тур уs: Rossia. «Altai, inter Kavuri et Mokok-Aczik, 5 Aug. 1927, I. Schischkin», ТК) с беловатыми или желтоватыми листочками околоцветника и светло-коричневой коробочкой, почти равной околоцветнику.

27. (382). *J. elbrusicus* Galushko, 1970, Новости сист. высш. раст. 6: 212.

Описан с Центрального Кавказа. Тур уs: «Prov. Elbrus, ad fontes fl. Malka (fl. Kartschul), 18. VIII. 1960, A. Galushko» (LE!).

ЦК: Малк.

Эндемик.

2. (67). *Luzula* DC.

Subgen. 1. *Pterodes* (Griseb.) Buchenau

1. (383). *L. pilosa* (L.) Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 1: 393. — *Juncus pilosus* L. 1753, Sp. Pl.: 329.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо- Арг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. Азия; Сев. Америка.

2. (384). *L. forsteri* (Smith) DC. 1806, in Lam. et DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 150. — *Juncus forsteri* Smith, 1804, Fl. Brit. 3: 1395.

Описан из Англии.

2а. *L. forsteri* subsp. *forsteri*

СЗЗ: Анап.-Гел., Пшад.-Джуб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.

Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

2б. *L. forsteri* subsp. *caspica* (Rupr. ex Bordz.) V. Novikov, 1990, Новости сист. высш. раст. 27: 18–19. — *L. caspica* Rupr. ex Bordz. 1928, Bull. Jard. Bot. Kiev, 7: 5. — *L. forsteri* var. *latifolia* Bordz. 1928, Bull. Jard. Bot. Kiev, 7: 5. — *L. forsteri* subsp. *forsteri* auct., non DC.: Гроссг. 1940, Фл. Кавк. изд. 2, 2: 79, pro max p.

Описан из Центрального Закавказья. Тур уs: «In Georgia in silva prope monasterium Zedazeni in viciniis urbis Tiflis, 28(15). V. 1928, cum fructibus immaturis urbis Tiflis [Tbilisi], T. A. Roop» (KW).

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Караб.; **ЮЗ:** Занг.; **Т:** Юго-Зап. Азия.

Subgen. 2. *Luzula*

Sect. 1. *Anthelaea* Griseb.

3. (385). *L. sylvatica* (Huds.) Gaud. 1811, *Agrost. Helv.* 2: 240. — *Juncus sylvatica* Huds. 1762, *Fl. Angl.*: 32.

Описан из Англии.

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.

Атл., Центр., Южн., Вост. (зап. районы Украины) Европа; Юго-Зап. Азия.

Sect. 2. *Alpinae* Chrtek et Krisa

4. (386). *L. spicata* (L.) DC. 1805, in Lam. et DC., *Fl. Fr.* ed.3, 3: 161. — *Juncus spicatus* L. 1753, *Sp. Pl.*: 330. — *L. spicata* f. *italica* (Parl.) H. Lindb. 1932, *Acta Soc. Sci. Fenn.*, n. s. B 1(2): 37. — *L. italica* Parl. 1857, *Fl. Ital.* 2: 309. — *L. stibocarpa* Kirschner et Krisa, 1979, *Preslia*, 51, 4: 336, fig. 2.

Описан из Скандинавии.

ЗК: Адаг.-Пшиш., Уруп.-Тeb.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Кубин.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Караб.; **ЮЗЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг.

Атл., Сев., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Полиморфный вид. В зависимости от условий обитания вегетативные и генеративные признаки побегов варьируют в значительных пределах. Одна из форм с относительно крупными (0.6–0.9 мм дл.) пыльниками — *f. italica* (Parl.) H. Lindb. (Турус: Sardinia, Monte Genargentu, E. Requier, FI) была обнаружена в Тебердинском заповеднике и описана в ранге вида — *Luzula stibocarpa* Kirschner et Krisa, nom. superfl. Турус: «Russia. Caucas, Dombay...», 14. Jul. 1977, J. Kirschner, M. Sourkova et al.» (PRC).

Sect. 3. *Luzula*

5. (387). *L. sudetica* (Willd.) Schult. 1814, *Österr. Fl.*, 2 ed., 1: 573. — *Juncus sude-ticus* Willd. 1799, *Sp. Pl.* 2: 221. — *Luzula stenophylla* auct. p. p.: Аветисян, 2001, *Фл. Арм.*, 10: 409–411.

Описан из Центральной Европы.

ЗК: Уруп.-Тeb.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Севан.

Сев., Центр., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

Полиморфный вид, к тому же гибридирующий с близкими *L. stenophylla* и *L. multiflora*; на наличие промежуточных форм между *L. sudetica* и *L. stenophylla* в Армении, например, указала В. Е. Аветисян (2001). Типичная форма *L. sudetica* отличается от *L. stenophylla* мелкими тычинками — до 1–1.2 мм дл. и пыльниками, которые в длину не превышают 0.3–0.4 мм и заметно (в 2–3 раза!) короче тычиночных нитей (у *L. stenophylla* тычинки 1.2–1.6 мм дл., а пыльники обычно длиннее тычиночных нитей или равны им).

6. (388). *L. stenophylla* Steud. 1855, *Syn. Pl. Glum.* 2: 294. — *L. multiflora* subsp. *pseudosudetica* V. Krecz. 1928, *Журн. Рус. бот. об-ва*, 12: 490. — *L. pseudosudetica* (V. Krecz.) V. Krecz. 1935, *Фл. СССР*, 3: 571. — *L. angustifolia* C. Koch, 1848, *Linnaea*, 21: 625, nom. illeg., non Poir. 1813.

Описан из Турции: «Vontes pontici».

ЗК: Адаг.-Пшиш., Уруп.-Тeb.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Кубин.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия.

7. (389). *L. abchasica* V. Novikov, 1989, Бюл. Моск. об-ва исп. прир., отд. биол. 94, 1: 111.

Описан из Западного Закавказья. Турус: «Абхазия, Гудаутский р-н, Рицинский заповедник, р. Авадхара, 20. VIII. 1975, Е. Гогина» (MW!).

ЗК: Адаг.-Пишиш., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., Кубин.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

8. (390). *L. pallescens* Sw. 1814, Summa Veg. Scand.: 13. — *L. pallidula* Kirschner, 1990, Тахон, 39: 110; Аветисян, 2001, Фл. Армении, 10: 411. -

Описан из Скандинавии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ЮЗЗ:** Ерев., Севан., Занг.; **Т:**

Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

В обработке рода *Luzula* для «Flora of the Word» (Kirschner et al., 2002) восстановлена приоритетность эпитета, под которым этот вид в 1814 г. описал О. Р. Swartz, а *L. pallidula* приводится в перечне синонимов.

9. (391). *L. taurica* (V. Krecz.) V. Novikov, 1990, Новости сист. высш. раст. 27: 200. — *L. campestris* (L.) DC. subsp. *taurica* V. Krecz. 1928, Журн. Рус. бот. об-ва, 12, 4: 490. — *L. multiflora* (Ehrh.) Lej. subsp. *taurica* (V. Krecz.) V. Novikov, 1976, Фл. Евр. части СССР, 2: 83.

Описан из Крыма: «Крымская яйла».

ЗК: Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Кубин.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Туап.-Адлер., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

Для территории Армении приводится впервые. Отличается от близкого и нередкого *L. multiflora* крупными пыльниками, до 2 мм дл., в 2-4 раза превышающей длину тычиночных нитей.

10. (392). *L. multiflora* (Ehrh.) Lej. 1811, Fl. Spa, 1: 169. — *Juncus campestris* var. *multiflora* Ehrh. 1790, Beitr. Naturk. 5: 14.

Описан из Скандинавии.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** **ЦЗ:** **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг., Мегр.-Зан.; **Т:**

Атл., Сев., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (Алтай), Юго-Зап. Азия; Сев. Америка; занесен в другие районы.

Гибридизирует с *L. taurica*.

ORDO 17. CYPERALES

Fam. 175. Cyperaceae Juss.*

Subfam. 1. Cyperoideae Suss.

1. (68). *Scirpus* L.**

1. (393). *S. colchicus* Kimer. 1975, Сообщ. АН ГрузССР, 80, 2: 441; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 5; она же, 1998, цит. соч. 31: 11; она же, 2004, цит. соч. 36: 60; А. Зернов, 2003, Бюл. Моск. об-ва исп. прир., отд. биол. 108, 3: 92.

*Т. В. Егорова, кроме родов *Eriophorum* (М. С. Новосёлова) и *Bolboschoenus* (И. В. Татанов).

**Т. В. Егорова (Егорова, 2004)