

7. (389). *L. abchasica* V. Novikov, 1989, Бюл. Моск. об-ва исп. прир., отд. биол. 94, 1: 111.

Описан из Западного Закавказья. Турус: «Абхазия, Гудаутский р-н, Рицинский заповедник, р. Авадхара, 20. VIII. 1975, Е. Гогина» (MW!).

**ЗК:** Адаг.-Пишиш., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., Кубин.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

8. (390). *L. pallescens* Sw. 1814, Summa Veg. Scand.: 13. — *L. pallidula* Kirschner, 1990, Тахон, 39: 110; Аветисян, 2001, Фл. Армении, 10: 411. -

Описан из Скандинавии.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ЮЗЗ:** Ерев., Севан., Занг.; **Т:**

Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

В обработке рода *Luzula* для «Flora of the Word» (Kirschner et al., 2002) восстановлена приоритетность эпитета, под которым этот вид в 1814 г. описал О. Р. Swartz, а *L. pallidula* приводится в перечне синонимов.

9. (391). *L. taurica* (V. Krecz.) V. Novikov, 1990, Новости сист. высш. раст. 27: 200. — *L. campestris* (L.) DC. subsp. *taurica* V. Krecz. 1928, Журн. Рус. бот. об-ва, 12, 4: 490. — *L. multiflora* (Ehrh.) Lej. subsp. *taurica* (V. Krecz.) V. Novikov, 1976, Фл. Евр. части СССР, 2: 83.

Описан из Крыма: «Крымская яйла».

**ЗК:** Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Кубин.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Туап.-Адлер., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

Для территории Армении приводится впервые. Отличается от близкого и нередкого *L. multiflora* крупными пыльниками, до 2 мм дл., в 2-4 раза превышающей длину тычиночных нитей.

10. (392). *L. multiflora* (Ehrh.) Lej. 1811, Fl. Spa, 1: 169. — *Juncus campestris* var. *multiflora* Ehrh. 1790, Beitr. Naturk. 5: 14.

Описан из Скандинавии.

**ЗП:** З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** **ЦЗ:** **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг., Мегр.-Зан.; **Т:**

Атл., Сев., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (Алтай), Юго-Зап. Азия; Сев. Америка; занесен в другие районы.

Гибридизирует с *L. taurica*.

## ORDO 17. CYPERALES

### Fam. 175. Cyperaceae Juss.\*

#### Subfam. 1. Cyperoideae Suss.

##### 1. (68). *Scirpus* L.\*\*

1. (393). *S. colchicus* Kimer. 1975, Сообщ. АН ГрузССР, 80, 2: 441; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 5; она же, 1998, цит. соч. 31: 11; она же, 2004, цит. соч. 36: 60; А. Зернов, 2003, Бюл. Моск. об-ва исп. прир., отд. биол. 108, 3: 92.

\*Т. В. Егорова, кроме родов *Eriophorum* (М. С. Новосёлова) и *Bolboschoenus* (И. В. Татанов).

\*\*Т. В. Егорова (Егорова, 2004)

Описан с Кавказа. Тур у s: «Грузия, Аджария, сев. макросклон Шавшетского хребта, окр. с. Гогадзееби, 1500 м н. у. м., эвтрофное болото, 10 VIII 1966, К. Р. Кимеридзе» (TGM!).

**ЗК:** Бело-Лаб. (Апшеронский р-н, окр. пос. Верхние Тубы — водораздельный хребет между реками Пшеха и Хахопсе); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (окр. г. Адлера — верховья р. Мзымты), Инг.-Рион. (между Диди-ве и Хобис-гави; истоки р. Лебарде), Адж. (сев. макросклон Шавшетского хребта — окр. с. Гогадзееби и Шуахевский р-н, р. Тбети).

Эндемик.

Очень близок североамериканскому виду *S. atrocinctus* Fern. *S. colchicus* габитуально сходен с *S. sylvaticus* L., от которого отличается отсутствием ползучих корневищ, черными основаниями кроющих листьев и гладкими околоцветными щетинками, которые при созревании плодов удлиняются и выступают из кроющих чешуй, придавая колоскам вид «шерстистых» (у *S. sylvaticus* основания кроющих листьев зеленые, околоцветные щетинки шероховатые, скрытые в пазухах кроющих чешуй).

2. (394). *S. sylvaticus* L. 1753, Sp. Pl.: 51; Рожев. 1935, Фл. СССР 3: 44, р. р.; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 14; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 6; она же, 2004, цит. соч. 36: 73; Ханджян, 2001, Фл. Арм. 10: 440.

**ЗП:** З. Ставро. (Ставрополь); **ВП:** В. Ставро. (пос. Александровское); **ЗК; ЦК:** В. Кум. (Железноводск), Малк. (Балкария: Сукан, Чайнашки, Суук-ауз; Прохладненский р-н: ст. Солдатская; басс. р. Баксан: Черная Речка); **ВК:** Ассо-Арг. (Сунженский р-н: окр. с. Верхний Аргун; водораздел рек Фортанги и Осухи); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (верховья р. Мзымты; Красная Поляна, Аше и гора Аутль), Абх., Инг.-Рион. (горы Накерана), Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт. (Цалка), Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев. (Мисхана), Севан.

Указан для **СЗЗ** (Зернов, 2000: 27); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Маралик); **ЮЗ:** Дар. (Джермук), Занг. (отроги горы Арамазд) (Ханджян, 2001: 440).

Европа; Средиз.; Сев. (южн.), Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Ср. (Казахстан) и Центр. (Китай: Джунгария) Азия.

## 2. (69). *Eriophorum* L.\*

1. (395). *E. latifolium* Норре, 1800, Bot. Taschenb.: 108; Юз. 1935, Фл. СССР 3: 29, р. р., excl. pl. ex Sibir. et Or. Extr.; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 12; Ханджян, 2001, Фл. Арм. 10: 448.

Описан из Германии.

**ЗК:** Уруп-Тоб.; **ЦК:** В. Тер. (Байдара); **ЗЗ:** Инг.-Рион., Адж. (верх. р. Аджарисцкали и Аджаро-Шавшетский хр.); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Юго-Осетия: Эрмани и Эрцойская котловина), Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд. (район Гянджи — ущ. Кюрах-чай; горы Кяпаз и Керогли); **ЮЗЗ:** Джав.-В.Ахур.; **ЮЗ:** Дар. (Азизбеков и с. Куци — берег р. Арпачай).

Европа; Юго-Зап. Азия (сев.-вост. и центр. Турция).

2. (396). *E. angustifolium* Honck. 1782, Vollst. Syst. Verz. Gew. Teutschl. 1: 153. — *E. polystachion* L. 1753, Sp. Pl.: 52, nom. rejic. — *E. angustifolium* Roth, 1788, Tent. Fl. Germ. 1: 24; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 12. — *E. latifolium* auct. non Норре: Юз. 1935, Фл. СССР, 3: 29, р. р., quoad pl. ex Sibir. et Or. Extr.

\*М. С. Новосёлова